



المجموعة :
13 Arylpyrrole

بايلورا -٪٢٤

مبيد عنكبي وحشري سام

مركز معلم

مبيد عنكبي وحشري واسع المدى يعمل عن طريق التأثير المعدى والملامسة، فعال جداً في مكافحة الآفات الرئيسية من الحشرات والعنكبوت على محاصيل البنادورة، القلقن، البازنجان، الخيار، الشمام، البامي، الفراولة، الملفوف، التفاح، الدراق، النكتارين، العنبر، الحمضيات، البصل ونباتات الزينة.

التركيب: كل ترتيب على :

٤٪ و ٢٤٪

كلورفيتايير

الخاص:

بايلورا-٪٢٤٪: مبيد حشري عنكبي له طريقة تأثير جديدة، حيث يؤثر على تحويل الطاقة في جسم الأفة.

بايلورا-٪٢٤٪: يعمل بكفاءة ممتازة لمكافحة الحشرات والعنكبوت التي اكتسبت مناعة ضد مركبات الفوسفور العضوية والكارباميات والبایرثرويد ومثبتات الكيتين الصناعية.

بايلورا-٪٢٤٪: يدخل في برامج المكافحة المتكاملة وذو أثر متبقى قليل جداً.

الاستعمالات:

الفترة الآمان	معدل الاستعمال مل/٢٠٠ لترماء	الحشرة	المحصول
١ يوم	١٠-٥ مل	الحلم الأحمر ذو النقطتين، الحلم الصدائي، التفاح، شمار البنادورة، الدينقارضة، ثريس الشمام.	البنادورة، القلقن، البازنجان، الخيار، الشمام، البامي. الفراولة
٧ أيام	١٠ - ٥ مل	عثة الظهر الماسي	الملفوف
٧ أيام	١٥-٥ مل ٣٠-٢٠ مل ٢٠-١٠ مل	حلم التفاح الصدائي، صانعات الانفاق، الحلم الأحمر ذو النقطتين.	التفاح.
١ يوم	٢٥-٢٠ مل	الثريص، صانعات الانفاق.	الدراق والنكتارين
٣ أيام	٢٠-١٠ مل	الحلم الأحمر ذو النقطتين	العنبر
٢١ يوم	٢٥-٢٠ مل	الحلم الصدائي، الحشرات القشرية، الدينقارضة.	الحمضيات
٧ أيام	١٠-٥ مل	ثريس البصل	البصل
—	١٠-٥ مل	الحلم الأحمر، الدينقارضة	نباتات الزينة

تحذير:

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل القطاف.

- لا يستعمل المبيد على الاشتال الصغيرة المنقلولة إلى الحقل حتى عمر أسبوعين.

فتررة تحرير دخول الحقل المرشوش: عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

قابلية للخطأ: يمكن خلطه مع معظم المبيدات والاسمدة الورقية عدا محلول بوردو.

السمية على النباتات: قد يظهر المبيد حساسية خطيرة على أنواع نباتات الزينة والحوليات مثل: (CARNATION, DIANTHUS, KAINCHOE, POINSETTIA, ROSES, SALVIA AND ZINNIA)