



المجموعة :
Phenylpyrazole

جارنت -٪ ٢٠

مبيد حشري
مركز معلق

مبيد حشري يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي واسع النطاق لمكافحة العديد من الآفات الزراعية مثل دودة الشمار، عثه العنب ، دودة الملفوف، ديدان الجنور، الخنافس، التربس، صانعات الانفاق على العديد من المحاصيل الزراعية وله فعالية كبيرة في مكافحة التمل الأبيض في الحقول الزراعية.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٦٠٪ (مادة فعالة) / وحدة

فبرونيل

الغواص :

جارنت -٪ ٢٠ : مبيد حشري يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي واسع النطاق لمكافحة العديد من الآفات الزراعية مثل دودة الشمار، عثه العنب ، دودة الملفوف، ديدان الجنور، الخنافس، التربس، صانعات الانفاق وغيرها على العديد من المحاصيل الزراعية.

جارنت -٪ ٢٠ : مبيد جديد ومتطور لمكافحة الأرضية (التمل الأبيض).

جارنت -٪ ٢٠ : ذو أثر متبقى طويل الأمد.

الاستعمال :

| المحصول | الاffectة | معدل الاستعمال لكل لتر ماء ٢٠٠ | فتررة الأمان (أيام) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| فجل، زهرة، ملفوف، خس | دودة الملفوف. عثه الظهر الملاسي. لخافات أوراق الملفوف. | ٧ ١٢,٥ ٢٥ - ٦,٢٥ ٢٥ - ١٢,٥ | |
| الباذنجان | التربس. | ١٤ ١٨,٧٥ - ١٢,٥ | |
| العنب | عثه العنب، دودة هربيان العنب، نظاظات الاوراق، الحضار. | ١٤ ٥٠ - ٢٥ | |
| الفلفل | السوس. | ١٤ ١٢,٥ | |
| البطاطا | السوسة البيضاء. الديدان السلكية. ديدان الجنور، نظاظات الاوراق. خنفساء كلورادو. التربس. | — ٧٥ - ٢٥ ٥٠ مل (يضاف للتربية) ٥٠ مل ١٥ - ٥ ٢٥ - ١٢,٥ | |
| الدرارق، التفاح، الاجاص | عثة الشمار الشرقيه. سوس الخوخ، النداية المنشارية، الفراشة الفتالة . عثة ثمار التفاح، نظاظات الاوراق. صانعات الانفاق، البسيلا. | ١٤ ٢٥ ٥٠ - ٢٥ ١٠٠ - ٢٥ ٧٥ - ٢٥ | |

دونم = ١٠٠٠ م²

تحذير : عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف .
مكافحة التمل الأبيض (الأرضية) في الحقول الزراعية :

يستعمل بمعدل ٢٠ - ١٢,٥ مل / دونم كما يلي :

- يتم الرش على سطح التربة ونقطي تقطيعية كاملة قبل الزراعة بحيث يتم حراثة التربة وخلطها مع المبيد على عمق ١٠ - ٥ سم.
- يتم رش خطوط الزراعة بعد البذر ومن ثم اتمام عملية تقطيعية البذر المعاملة بالتربيه .

فتررة تعرييم دخول الحقل المروشوش : يمنع دخول الحقل المروشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة .
قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات ويفضل عمل تجربة خلط مبدئية.