



المجموعة:
Dithiocarbamate

سبورنيب -٪٧٠

مبيد فطري زراعي سام / بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري يعمل عن طريق الملامسة، وقائي ويكافح العديد من الأمراض الفطرية على مدى واسع من المحاصيل الزراعية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

بروبينتب (مادة فعالة)٪٧٠ و/و

الغواص :

سبورنيب-٪٧٠: مبيد فطري وقائي فعال يعمل عن طريق الملامسة ويقضي على العديد من الأمراض الفطرية.

سبورنيب-٪٧٠: ذو مجال واسع في مكافحة الأمراض الفطرية وخاصة الفطريات البيضية، الاسكية، البازيدية والناقصة.

سبورنيب-٪٧٠: له فعالية عالية في مكافحة العفن الأزرق على التبغ، والتبقعات واللفحات على البطاطا والبندوره، والتبعق

الرمادي على الأوراق في البندوره، والبياض الزغبي على الخيار والبصل، والتبعق الأسود على الحمضيات

والعديد من الأمراض الفطرية الأخرى.

الاستعمال :

الفترة الآمن (أيام)	معدل الاستعمال لتر ماء / ٢٠	المرض	المحصول
٧	٦٠ - ٤٠ غم ٢٠ غم ٦٠ - ٤٠ غم	اللفحه المتأخرة والمبكّره، تبقع الاوراق. البياض الزغبي في البيوت الملاستيكية. البياض الزغبي، عفن الرقبة، صدأ الفاصولياء، الانثراكنوز.	البندوره، الخيار، الشمام، البصل، الخس، الفاصولياء.
٧	٨٠ - ٥٠ غم	اللفحه المبكّره والمتأخرة.	البطاطا.
١٤	٤٠ غم	الجرب (رش قبل وبعد الازهار).	التفاح، الاجاص.
١٤	٤٠ - ٢٠ غم	البياض الزغبي (رش المشاتل مرتين في الاسبوع وبعد نقل النباتات الى الحقل رش مرة او مرتين حسب الاصابة).	التبغ.

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.

فتررة تعرييم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الغلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المركبات القلوية.

* اسماء تجارية اخرى: بروبيكون - WP٪٧٠ .