

المجمومة:
Thiophanate

فابكوتوب - ٧٠٪



مبيد فطري زراعي سام / بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى يمتص عن طريق الأوراق والجذور، يستعمل لمكافحة عدد كبير من الأمراض الفطرية على مدى واسع من المحاصيل الزراعية كما يستخدم لمعالجة الجروح الناتجة عن العمليات الزراعية المختلفة.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٧٠٪ و/و (مادة فعالة)

ثيوفثيت - ميثيل

الخواص:

فابكوتوب- ٧٠٪: مبيد جهازى وقائى وعلاجى يمتص عن طريق الجذور وينتقل عن طريق العصارة.

فابكوتوب- ٧٠٪: لا يتأثر بهطول الأمطار واعدة الرش غير ضرورية فالمبيد يبقى فعال لفترة طويلة من الوقت.

فابكوتوب- ٧٠٪: يستعمل لمكافحة الأمراض الفطرية المذكورة في جدول الاستعمال على المحاصيل الزراعية التالية:

الحمضيات، التفاح، الاجاص، الدراق، المشمش، العنب، الكرز، الفاصولياء، البازيلاء، الخس، البطاطا، البطيخ، الشمام، الخيار، البندورة، الباذنجان، الباميا، الفلفل، البصل، الكوسا، ملفوف، قمح، شعير، جذور اللوزيات والتفاحيات، التوت الأرضي، التبغ.

الاستعمال:

المحصول	المرض	طريقة الاستعمال	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
البرتقال، الليمون، الكلمنتينا، الندرين، البوملي.	عفن نهاية الساق، العفن الازرق، العفن الأخضر. الجرب، العفن الرمادي.	الرشة الأولى : تتم عند ملاحظة أعراض الإصابة بالمرض. أما	٧ - ١٠ غم	يوم واحد
التفاح، الاجاص، الدراق.	البياض الدقيقي، الجرب، التقرح، العفن البني.	في حالة استمرار المرض تتم الرشة الثانية بعد	١٠ - ٢٠ غم	يوم واحد
العنب	البياض الدقيقي، العفن الاسود، عفن الافرع .	١٥-٢٠ يوم من الرشة الأولى.	١٤ - ٢٠ غم	١٤
المشمش.	الجرب.		١٥ - ٢٠ غم	٢١
الكرز.	العفن البني، تنقب الاوراق.		١٥ - ٢٠ غم	١٤
الفاصولياء، البازيلاء، الخس، البطاطا.	العفن الرمادي، عفن الساق، تنقب الاوراق، العفن الابيض.		١٥ - ٢٠ غم	٧
البطيخ، الشمام، الخيار، البندورة، الباذنجان، الباميا، الفلفل، البصل، الكوسا .	البياض الدقيقي، العفن الرمادي، الجرب، لثحة الساق الصمغية، الانثراكنوز، عفن الساق، عفن الاوراق، العفن الابيض، العفن الاسود، الذبول الفيوزارمي.		١٥ - ١٠ غم	يوم واحد
الملفوف.	العفن الابيض.		١٥ - ٢٠ غم	٣
القمح، الشعير.	البياض الدقيقي، اللثحة، الفيوزاريوم.		١٠ - ٢٠ غم	١٤



المحصول	المرض	طريقة الاستعمال	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
جذور اللوزيات و التفاحيات.	تخمج الجذور الابيض (تغطيس الجذور لمدة ١٠ دقائق)	الرشة الأولى : تتم عند ملاحظة أعراض الإصابة بالمرض. أما	٤٠ غم	---
التوت الارضي	ذبول الفيوزاريوم (تغطيس الجذور لمدة ساعة) .	في حالة استمرار المرض تتم الرشة الثانية بعد	٤٠ - ٥٠ غم	---
التبغ.	عفن الساق الابيض، البياض الدقيقي، الذبول، عفن الساق الاسود (سفاية المشتل) .	١٥-٢٠ يوم من الرشة الأولى.	١٥ - ٢٠ غم ٢ - ٣ لتر / ٢م	---

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المواد شديدة القلوية وتلك التي تحتوي على النحاس.