

المجموعة :
Chlorinated hydrocarbons (I)
Chlorinated bridged diphenyl (n)

فابكوثيون

مبيد زراعي عناكبي / سام
مركز مستحلب



مبيد فتاك واسع المفعول يقضي على العناكب (الحلم) في جميع أطوارها (بيض، يرقات، حوريات وأطوار كاملة).

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢١,٢٥ ٪ و/ح (مادة فعالة)

دايكوفول^(١)

٨ ٪ و/ح (مادة فعالة)

تتراديفون^(٢)

الخواص :

فابكوثيون : يقضي على معظم أنواع العناكب التي تهاجم البندورة ، البطيخ، الشمام، العنب، نباتات الزينة في جميع أطوار حياتها (بيض ، يرقات ، حوريات ، أطوار كاملة).

فابكوثيون : لا يتأثر المبيد بالحرارة الطبيعية والضوء، فهو مبيد ثابت وتستمر فعاليته لمدة طويلة.

فابكوثيون : غير ضار للأعداء الطبيعية للحلم والعناكب .

فابكوثيون : يفتك بالعناكب عن طريق الملامسة.

فابكوثيون : يتخلل الأوراق بسرعة ويفتك بالعناكب المتواجدة عليها نتيجة هذه الميزة .

فابكوثيون : غير سام للنحل.

الإستعمال :

المحصول	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
البندورة في البيوت المحمية	٤٠ مل	١٥ يوم
العنب	٤٠ - ٥٠ مل	١٥ يوم
نباتات الزينة	٤٠ مل	١٥ يوم
البطيخ، الشمام (الحقول المفتوحة)	٤٠ - ٥٠ مل	١٥ يوم

تحذيرات : يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه، مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

مواعيد الرش :

- الرش عند بدء الإصابة (عند مرحلة التفقيس).
- يفضل الرش صباحاً أو مساءً في غياب تيارات الهواء المتوسطة والشديدة السرعة.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع جميع المبيدات وغير قابل للخلط مع نترات الكالسيوم، كابتايفول والكبريت.