



المجموعة:
Acylalanine^(١)
Chloronitrile^(٢)

فاكوميل - اكسترا ٤٤٪

مبيد فطري جهازي زراعي سام
مركز معلق

مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي وفعالية عالية للقضاء على العديد من الأمراض الفطرية على البطاطا والبندورة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤٪ و/ح (مادة فعالة)

ميتابلاكسيل - م^(١)

٤٪ و/ح (مادة فعالة)

كلوروثنالونيل^(٢)

الخواص:

فاكوميل - اكسترا ٤٪ : مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي .

فاكوميل - اكسترا ٤٪ : يستعمل لمكافحة الأمراض الفطرية كاللحفة المبكرة، اللحفة المتأخرة على البطاطا والبندورة .

فاكوميل - اكسترا ٤٪ : يعمل كمثبط نمو الفطر ويوفر الحماية المتكاملة عن طريق تكوين طبقة تمنع نمو الأبواخ في داخل أجزاء النبات .

فاكوميل - اكسترا ٤٪ : يتمتص عن طريق الأنفسنة الخضراء ومن ثم ينتقل للأوراق والساقي .

الاستعمال:

| فتره الأمان | ملاحظات | نسبة الاستخدام لتر ماء / ٢٠ | المرض | المحصول |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ١٤ يوم | يرش المحصول ٣ رشات بعد ١٤ يوم من تاريخ آخر رشة خلال فترة النمو النشط. تتم الرشة الأولى عند الاتبات وقبل حدوث الاصابة . لا تستخدم المبيد في الفترة بعد اكمال فتره الازهار . | ٦٧ - ١٠٠ مل | اللحفة المبكرة، اللحفة المتأخرة | البندورة، البطاطا |

تحذير:

لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير المذكورة اعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

فتره تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخليط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات باستثناء المواد الشديدة القلوية.