



المجموعة:
Dithiocarbamate^(١)
Acylalanine^(٢)

فاكوميل ام زد -٪٧٢

مبيد فطري زراعي سام / بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري ذو فعالية عالية له تأثير جهازي وبالملامسة يقضي على عدد من الامراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية كما هو موضح في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

مانكوزيب^(١) ٪٦٤ و / و (مادة فعالة)
ميتابلاكسيل^(٢) ٪٨ و / و (مادة فعالة)

الخواص :

فاكوميل - ام زد ٪٧٢ : ذو فعالية مزدوجة ومتکاملة تومن وقاية مزدوجة للنبات خلال فترة نموه حيث تعمل مادة ميتا لاكسيل الجهازية على تأمين الوقاية للنبات داخل انسجته بينما تؤلى مادة الفطرية الأخرى المعروفة خلال سبعة أيام من اخر رشة للمبيد فاكوميل - ام زد .

فاكوميل - ام زد ٪٧٢ : يقاوم عد كثير من الامراض الفطرية التي تصيب عدد كبير من المحاصيل الزراعية .

الاستعمال :

الفترة الآمنة (أيام)	النحوات	الفترة بين الرشات	معدل الاستعمال /_ لتر ماء	المرض	المحصول
٧	يعاد الرش ٣ مرات خلال فترة النمو النشيط للنبات وعندما ينعدم عمر النبات يستخدم احد المبيدات الفطرية الأخرى المعروفة خلال سبعة أيام من اخر رشة للمبيد فاكوميل - ام زد .	٧ أيام	٧٠ غم	البياض، الزغبي، الدائمة	البنودورة في الارض الدائمة
١٤	يعاد الرش ٣ مرات خلال فترة النمو النشيط للنبات، ابدأ الرش قبل ظهور الاصابة وعندما يتقدم عمر النبات استخدام احد المبيدات الفطرية الأخرى المعروفة خلال سبعة أيام من اخر رشة للمبيد فاكوميل - ام زد .	٧ أيام	٥٠ غم	اللفحة المتأخرة، اللفحة	البطاطا
١٠	يعتم الرش ٣ مرات على الاكثر لكل محصول، ابدأ الرش لأول مرة قبل ظهور الاصابة.	٧ أيام	٥ غم	المبكرة	البصل
١٤	٤ مرات خلال الموسم على النحو التالي : ١. الرشة الاولى : عندما يكون طول النباتات ٢٥-٢٠ سم . ٢. الرشة الثانية : قبل الازهار مباشرة وبعد ١٤ يوم من الرشة الاولى . ٣. الرشة الثالثة : عند نهاية مرحلة الازهار . ٤. الرشة الرابعة : بعد ١٤ يوم من انتهاء مرحلة الازهار . استعمل المبيدات الأخرى بعد ٧ أيام من اخر رشة للمبيد، فاكوميل - ام زد .	١٠ أيام	٥٠ غم	تبقع الأوراق .	العنبر

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.

فتررة تعریم دخول الحقل المرشوش : عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة .

قابلية الخلط : يمكن خلطه مع معظم المبيدات الفطرية والحسائية المعروفة ما عدا المواد القلوية ، وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية قبل الرش .

* تراكيب واسماء تجارية أخرى: فاكوميل - فورت - WP (مانكوزيب ٤٨٪ + ميتا لاكسيل ١٠٪)، باتالاكسيل - ٪٧٢ .