

المجموعة:  
Acylalanine<sup>(1)</sup>  
Dithiocarbamate<sup>(2)</sup>

# فاكوميل - جولد ٦٨ %



مبيد فطري جهازي زراعي سام

بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري جهازي ذو تركيبة مميزة ويعمل بالملاسة للقضاء على معظم الأمراض الفطرية مثل اللسعات والبياض الزغبي وأمراض الأعفان.

**التركيب :** كل كغم يحتوي على :

٤% و/و (مادة فعالة)  
٦٤% و/و (مادة فعالة)

مبيد فطري جهازي زراعي سام  
مبيد فطري جهازي زراعي سام

**الخواص :**

**فاكوميل- جولد ٦٨% :** مبيد فطري جهازي وفعال لمقاومة الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية  
**فاكوميل- جولد ٦٨% :** له تأثير مباشر على الأمراض الفطرية على الأوراق وفي التربة مثل اللسعات، الأعفان والبياض الزغبي.  
**فاكوميل- جولد ٦٨% :** ليس له أي تأثيرات سلبية على النبات.

**الاستعمال :**

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام	ملاحظات	فترة الأمان (أيام)
البطاطا	اللسعة المبكرة، اللسعة المتأخرة، اعفان التخزين، العفن الزهري .	١١٣ غم/ دونم مع كمية مياه مناسبة لضمان التغطية الجيدة للأوراق (للمعاملة العادية عن طريق الاوراق) يستخدم ١١٣ غم / ٥٠ لتر ماء على الأقل / دونم	يرش المحصول ٣ رشات / موسم حيث تبدأ المعاملة مبكرة ويجب أن تكون أول رشة قبل ملاسة اوراق البطاطا للتربة وتتم الرشة الثانية والثالثة بعد ١٠-١٤ يوم من آخر رشة.	١٤
الخيار، البطيخ، الشمام، الكوسا	البياض الزغبي.	١٢٧ غم/ دونم مع إضافة كمية مياه مناسبة لضمان تغطية جيدة للأوراق	يبدأ الرش عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث المرض وقبل الإصابة وتستمر لمدة ١٤ يوم حتى تقل فرصة الإصابة بالمرض، ولضمان الوقاية يتم رش مبيد فطري وقائي بين رشات فاكوميل- جولد ٦٨% ولا يتم رش المحصول في نهاية الموسم عندما يكون في مرحلة النضج الكامل.	٥
البصل، الثوم (الابصال الجافة).	البياض الزغبي.	١١٣ غم/دونم مع إضافة كمية مياه مناسبة لضمان تغطية جيدة للأوراق	يرش المحصول ٣ رشات / موسم كل ٧ - ١٤ يوم.	٧
الشمندر السكري.	البياض الزغبي.	١٢٧ غم/دونم	يبدأ الرش عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث المرض وقبل الإصابة وتستمر لمدة ١٤ يوم حتى تقل فرصة الإصابة بالمرض.	١٤



فترة الأمان (أيام)	ملاحظات	نسبة الاستخدام	المرض	المحصول
٥	يبدأ الرش عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث المرض وقبل الإصابة وتستمر لمدة ١٤ يوم حتى تقل فرصة الإصابة بالمرض، حيث يتم رش المحصول ٣ مرات لمدة ١٤ يوم، ولضمان الوقاية من الأمراض يتم الرش بمبيد وقائي بين رشات فاكوميل-جولد ٦٨% وبعد انتهاء الرش التلات للمبيد فاكوميل-جولد ٦٨% يتم استخدام مبيد وقائي ضمن جدول اسبوعي لما تبقى من الموسم.	١٢٧ غم/ دونم مع إضافة كمية مناسبة من الماء لضمان التغطية الجيدة للأوراق وللمعاملة الميكرو يستخدم ٥,٦ لتر ماء على الاقل/ دونم	اللفحة المتأخرة.	البندورة

دونم = ١٠٠٠ م<sup>2</sup> هكتار = ١٠٠٠٠ م<sup>2</sup>

**تعدير :** عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

### فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

### قابلية الخطأ :

قابل للخلط مع معظم أنواع المبيدات باستثناء المواد الشديدة القلوية.