



المجموعة :  
Organophosphate

# فيناتود - ١٠%

مبيد نيماتودي  
حببيات

مبيد نيماتودي جهازي يعمل باللامسة ضد النيماتود في البندورة والحمضيات والموز والبطاطا.  
التركيز: كل كغم يحتوي على :

فينامييفوس ١٠٪ (مادة فعالة)

الخواص :

فيناتود - ١٠٪: مركب فسفوري عضوي مشيط لإنزيم الكولين استريليز ذو فعالية قوية لكافحة النيماتود.

فيناتود - ١٠٪: مبيد جهازي يعمل عن طريق الملامسة يمتص من الجذور حتى يصل للأوراق و يحمي النباتات من أي اصابة جديدة.

فيناتود - ١٠٪: ينتشر بسرعة داخل التربة و يكافح النيماتود المتواجدة في التربة العميقه، كما أن للمبيد اثر متبقى طويل يستمر لأشهر.

فيناتود - ١٠٪: له قدرة على تحفيز النمو و زيادة الإنتاج و تحسين نوعية الانتاج.

فيناتود - ١٠٪: فعال في مكافحة آفات التربة مثل الطفيليات الخارجية والداخلية النيماتود المتحوصلة و نيماتود تعقد الجذور.

## الاستعمال:

لا يستعمل فيناتود - ١٠٪ إلا في التربة الرطبة إما أثناء فصل الشتاء و إما بعد الري. اخلط المحببات قليلاً بالتربة حالاً بعد النشر.

الفترة الآمنة (أيام)	نسبة الاستعمال	الآفه	المحصول
٩٠	يسعمل فيناتود - ١٠٪ مرة واحدة في الربيع بمعدل ٤٠ غم لكل متر مربع. يضاف فيناتود - ١٠٪ بمعدل ٢٠-٤٠ غم لكل متر بعد الحصاد مباشرة و في حالة الإصابة الشديدة يضاف مرة ثانية وينفس العدل في الخريف بشدة تحت الشجر و يخلط بعمق ١٠-٥ سم و تروي بمعدل ٢٥ لتر لكل متر مربع.	نيماتودا التدبر البطيء	الحمضيات - الأشجار الصغيرة - الأشجار ال عمرة
٩٠	في الحال المفتوح أضف قبل ١٤ يوم من زراعة الشتل في الأرض الدائمة على الخطوط ثم قم بتنشيف التربة بعمق ٣-٦ سم ثم اروي الأرض بغزارة بمعدل ٢٠ لتر ماء / وذلك بمعدل ١,٥ كغم / دونم. في البيوت البلاستيكية تنشر المادة قبل ١٤ يوم من الزراعة بمعدل ٤ كغم / دونم وتنشيف بعمق ١٠-٥ سم و تروي بغزارة.	نيماتودا	البندورة
٦٠	اضف فيناتود - ١٪ في الخلط مع التقاوى ثم غسل الخط واروي بغزارة وذلك بمعدل ١ كغم / دونم. معاملة جميع الحال اثثر فيناتود - ١٪ بمعدل ٦-٤ كغم / دونم قبل أسبوعين من زراعة التقاوي .	نيماتودا	بطاطا
٦٠	الفسائل الجديدة : تغطى الفسائل بخلط من الطين مع الماء المضاف اليه فيناتود - ١٪ بمعدل ٨ كغم لكل ١٠٠٠ المتر من الطين. تعاد المعاملة بعد أربعة شهور في حالة الاصابة الشديدة وذلك بتناثر المحببات على بعد ٣٠-٢٥ سم حول الحفرة أثناء ظهور العنقود الزهري ثم تروي بغزارة .	نيماتودا	الموز

دونم = ١٠٠٠

**تحذير:** عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردہ اعلاه مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف .

**قابلية الخلط:** قابل للخلط مع نفس المبيدات المحضره على هيئة الحببيات وغير قابل للخلط مع المبيدات القلوية .