

المجموعة:
Benzimidazole

كاربنداميل - ٥٠٪

مبيد فطري جهازى زراعي سام
مركز معلق



مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى يستعمل لمكافحة العديد من الامراض الفطرية على العديد من محاصيل الفواكه (التفاحيات، اللوزيات، العنب، الموز و الزيتون)، الحمضيات، الخضار (البندورة، البطاطا، الكوسا، البصل، الثوم، الباذنجان و الفاصولياء)، المحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، الذرة) و نباتات الزينة.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٥٠٪ و/ح (مادة فعالة)

كاربنداميل

الخواص:

كاربنداميل-٥٠٪ : مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائى وعلاجى.
كاربنداميل-٥٠٪ : يمتص عن طريق الجذور والأنسجة الخضراء وينتقل من الاسفل لأعلى.
كاربنداميل-٥٠٪ : يعمل كمثبط لنمو الأبواغ ونمو الميسيليوم.
كاربنداميل-٥٠٪ : يؤمن حماية ذات كفاءة عالية للنبات ضد العديد من العوامل الممرضة.

الاستعمال :

المحصول	المرض	نسب الاستعمال	فترة الأمان
أشجار الفاكهة : الشمش، الخوخ، الكرز، الدراق، اللوز، الاجاص، التفاح، العنب، الموز، الزيتون .	البياض الدقيقي، الجرب، البوترايتس (شلل العنب)، لفحة البراعم، جميع أنواع العفن (البني، الأزرق، الرمادي). الانثراكنوز، العفن الاسود، عفن الموز التاجي.	(١٠ مل/ ٢٠ لتر ماء) لمقاومة العفن الرمادي والبياض الدقيقي على العنب يتم مضاعفة النسب السابقة. ٢٠ مل/ ٢٠ لتر ماء	١٤ يوم من تاريخ آخر رشه
الليمون، البرتقال، اليوسفي، المندرين، جريب فروت.	العفن الاخضر، التبقع الاسود، الجرب، الميلانوز، التصدع.	١٠ مل/ ٢٠ لتر ماء	١٤ يوم من تاريخ آخر رشه
المحاصيل الحقلية: القمح، الشعير، الذرة.	تبقع العصابات، التبقع العيني، تبقع الاوراق السبتوري، التلطح الشبكي على الشعير، تبقع الاوراق، البياض الدقيقي، امراض الفيوزاريوم.	٢٥-٥٠ مل/دونم ٢٥٠-٥٠٠ مل/هكتار	١٤-٢١ يوم من تاريخ آخر رشه
محاصيل الخضار: البندورة، البطاطا، الكوسا، البصل، الثوم، الباذنجان، الفاصولياء.	تعفن السيقان، تبقع الاوراق السيركوسوري، امراض الذبول الرايزكتونيا، قرح السيقان في البندورة، تعفن الثمار، الانثراكنوز، الذبول الفيوزاريومي، البياض الدقيقي.	١٠-٢٠ مل/ ٢٠ لتر ولمقاومة امراض الذبول المتسببة عن الفيوزاريوم، الرايزوكتونيا و الهيلمثوسبوريوم يجب ان تكون النسبة ٦٠-٨٠ مل/ ٢٠ لتر ماء.	٣ ايام من تاريخ آخر رشه



المحصول	المرض	نسب الاستعمال	فترة الأمان
تعقيم التقاوي، القمح، الشعير، الشوفان، البقوليات، درنات البطاطا، ابصال، الدرنة والكورومات.	امراض البوترائيس، الفيوزاريوم، سبتوريا، الهيلمنتوسبوريم، موت البادرات الرايزوكتوني، التفحم السائب، التفحم المغطى.	يستخدم كارينداميل-٥٠٪ بنسبة ١,٥ لتر/طن من بذور الحبوب المعاملة بحيث يمكن رشه على طن الحبوب بعد تخفيفه به، ١ لتر ماء وبذلك فان نسبة الرطوبة المضافة تساوي ٣ لتر/طن (أي ٠,٣٪) وهي نسبة ليس لها تأثير.	---
نباتات الزينة.	الفيوزاريوم، البياض الدقيقي، سبتوريا، العفن الرمادي، تعفن الجذور، تبقع الأوراق.	٢٠-٤٠ مل/لتر ماء	---

الطن = ١٠٠٠ كغم دونم = ١٠٠٠ م^٢ هكتار = ١٠٠٠٠ م^٢

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

تحذير:

تغطس الثمار مثل التفاح، الاجاص، الرمان، الخوخ، الدراق، النكتارين، الموز و درنات البطاطا عند تخزينها لحفظها من الامراض الفطرية في معلق المبيد في الماء بنسبة ١٪ وذلك لمدة ١-٤ دقائق فقط مباشرة بعد القطف ويجب ترك الثمار حتى تجف قبل تخزينها.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلووية منها .