

الجموعة :
Organophosphate

كلوروفت - ٤٨%



مبيد حشري
مركز مستحلب

مبيد حشري فسفوري غير جهازي يعمل باللامسة وعن طريق الجهازين الهضمي والتنفسي، يستعمل لمكافحة الآفات التي تصيب البطاطا، الجزر، الحمضيات، أشجار الفاكهة.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٤٨% و/ح (مادة فعالة)

كلوربيرفوس

الخواص :

كلوروفت-٤٨% : مبيد حشري خاص لمكافحة الحشرات القشرية والحشرات الماصة الأخرى على الحمضيات، التفاح وأشجار الفاكهة الأخرى.

كلوروفت-٤٨% : مبيد غير جهازي يعمل باللامسة وله تأثير معوي سام وعن طريق الجهاز التنفسي.

كلوروفت-٤٨% : يستعمل لمكافحة حشرات التربة.

كلوروفت-٤٨% : لا يشكل ضرر على النباتات في ظروف استعماله.

الاستعمال :

المحصول	الآفة	معدل وموعد الاستعمال	فترة الأمان
البطاطا ، الجزر.	ديدان الأوراق، الديدان القارضة، اليرقات الليلية، المن، الذبابة البيضاء، التريس.	٣٣-٤٢ مل/٢٠ لتر ماء يرش عند ظهور البيوض أو الديدان بشكل واضح. كرر الرش مع ظهور الديدان الجديدة أو كل اسبوعين.	٢١ يوم
الحمضيات.	الحشرة القشرية الحمراء، البق الدقيقي، الحشرة القشرية السوداء، الحشرة القشرية البنية الرخوة، الذبابة البيضاء، التريس دودة ازهار الحمضيات.	٢١-٢٥ مل/٢٠ لتر ماء يستعمل من شهر حزيران - ايلول وقبل وصول الاصابة الى الثمار ويرش ٣ رشات حتى القطف	٢١ يوم
التفاح، الاجاص، المشمش، الخوخ، الدراق، الزيتون.	دودة ثمار التفاح، من التفاح القطني، ديدان الثمار، ثاقبات الأوراق، حشرات الزيتون القشرية، المن، العناكب.	١٧-٢٥ مل/٢٠ لتر ماء	١٤ يوم

تحذير :

- عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة اعلاه مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف .
- يجب عدم الرش خلال فترة الإزهار لأنه سام للنحل.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع جميع المبيدات الفطرية والحشرية المعروفة ما عدا القلووية منها.

* تراكيب وأسماء تجارية أخرى :

كلوروفت - ٤٨% WP ، كلوروفت - ٥٠% EC ، كلوروفت - ٥٥% EC ، كلوروفترين - ٥٥% EC (كلوربيرفوس ٥٠% + سايبيرثرين ٥%) .