



المجموعة:  
Chloronitrile

# كlorونيل - ٧٥٪

مبيد فطري زراعي سام

بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري غير جهازي وقائي وعالجي يكافح العديد من الامراض الفطرية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

كlorونيل ٧٥٪ و / و (مادة فعالة)

كlorوثرالونيل

الغواص :

كlorونيل - ٧٥٪: مبيد فطري غير جهازي فعال ضد الامراض الفطرية عند رشه مباشرة أو عند استخدامه كجزء من برنامج المكافحة .

كlorونيل - ٧٥٪: يكافح عد كثير من الامراض الفطرية التي اكتسبت مقاومة من المبيدات الأخرى .

كlorونيل - ٧٥٪: مبيد ذو ثباتية عالية ولا يفسد بالأمطار وبقى مفعوله لمدة طويلة .

كlorونيل - ٧٥٪: غير سام للنباتات في ظروف استعماله الطبيعية .

الاستعمال :

فترات الأمان (أيام)	معدل الاستعمال	المرض	المحصول
١٥	٤٠ غم / ٢٠ لتر ماء	الملفحة المتأخرة، الملحة المبكرة، عفن الجذور، البياض الزغبي.	البطاطا
١٤	٤٠ غم / ٢٠ لتر ماء	الملفحة المتأخرة، انشاراكتون، التبعق السبتيوري، العفن البني.	البنادرة.
١٥	٣ - ٢ كغم / هكتار.	الصدأ، اللفحات.	الحبوب.

هكتار = ٢ م٢

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

ملاحظات :

- يمكن استخدامه بمعدل ٥٠ غم / ٢٠ لتر ماء للري لقاومة أمراض التربة مثل الذبول ( الرايزوكتونيا ) .

- للحصول على افضل النتائج ينصح بالبلاشرة ببرنامج رش وقائي منذ أوائل الموسم الزراعي وعدم الانتظار لحين ظهور أعراض المرض .

- ينصح بإعادة الرش كل ٧ - ١٠ أيام .

- عند إصابات المرض الشديدة يعاد الرش ضمن فترات أقصر وزيادة نسبة الاستعمال .

فترات تحرير دخول الحقل المرشوش : عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة .

قابلية الماء : يخلط مع معظم المبيدات المعروفة ولكن ينصح بعمل تجربة خلط بسيطة قبل المزج ولا ينصح بخلطه مع الأسمدة الورقية .

\* تراكيب أخرى: كلورونيل - ٧٥٪SC