



المجموعة:  
Dithiocarbamate<sup>(١)</sup>  
Cyanoacetamide Oxime<sup>(٢)</sup>

# كورتين - ف

مبيد فطري زراعي سام  
بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري وقائي وعلاجي يعمل باملامسة ذو تأثير فعال لمكافحة الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمال.

**التركيب :** كل كغم يحتوي على :

مانكوزيب<sup>(١)</sup>  
سيموكسانيل<sup>(٢)</sup>

٤٦,٥٪ و / و (مادة فعالة)  
٤٪ و / و (مادة فعالة)

**الغواص :**

كورتين - ف: سريع الامتصاص من قبل النبات بحيث تضمن استفادة النبات منه بسرعة وقبل أن يفقد بواسطة الأمطار.

كورتين - ف: ذو تأثير وقائي ممتاز يمنع تكون الميسيليووم خلال فترة الحضانة ولدنة أربعة أيام بعد العدوى.

كورتين - ف: يمكن رشه بعد ثلاثة أيام من سقوط الأمطار لاستمرار النتائج الجيدة وضمان وقاية المحاصيل.

**الاستعمال :**

فتره الأمان (أيام)	معدل الاستعمال لتر ماء / ٢٠	المرض	المحصول
١٤	٥٠ - ٤٠ غم	البياض الزغبي.	العنب.
١٥	٥٠ - ٤٠ غم	البياض الزغبي، اللفحات.	البطاطا، البنادورة.
١٥	٥٠ - ٤٠ غم	البياض الزغبي.	الخس.
١٤	٥٠ - ٤٠ غم	البياض الزغبي.	البصل، الثوم.
١٤	٥٠ - ٤٠ غم	البياض الزغبي.	التبغ.

**تحذير :** عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

**فتره تحريم دخول الحقل المرشوش :**

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

**قابلية الخلط :**

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ولكن ينصح بعمل تجربة خلط قبل الاستعمال.

\* تراكيب أخرى: كورتين - ف WP٪ ٧٢ (مانكوزيب٪ ٦٤ + سيموكسانيل٪ ٨)،  
كورتين - ف WP٪ ٧٦ (مانكوزيب٪ ٥،٥ + سيموكسانيل٪ ٥،٩).