



المجموعة:
Dithiocarbamate^(١)
Inorganic Compound^(٢)

مانتوكس - فورت

مبيد فطري زراعي سام

بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري وقائي ذو فعالية عالية لمكافحة اللفحات المبكرة والمتاخرة، الانثراكتون، تبعق الأوراق، البياض الزغبي، الأصداء، التبعق الزاوي على المحاصيل الزراعية التالية: الخيار، البندورة، البطاطا، البصل، الملفوف، البامية، الفاصولياء، البازنجان، الفلفل.

التركيب : كل كغم يحتوي على:

مانكوزيب^(١)

٢٠٪ و / و (مادة فعالة)

٢١.٥٪ و / و (مادة فعالة)

٪ ٦

نحاس صافي على شكل اوкси كلوريد النحاس وسلفات النحاس^(٢)

مواد محفزة (سلفات الحديد)

الغواص :

مانتوكس-فورت : مبيد فطري وقائي ذو فعالية عالية لمكافحة اللفحات المبكرة والمتاخرة، الانثراكتون، تبعق الأوراق، البياض الزغبي، الأصداء، التبعق الزاوي على المحاصيل الزراعية مثل: الخيار، البندورة، البطاطا، البصل، الملفوف، البامية، الفاصولياء، البازنجان، الفلفل.

مانتوكس-فورت : ذو مجال واسع لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية ويحمي من تكوين المناعة ضد المبيدات.

مانتوكس-فورت : يملك حماية طويلة الأمد أكثر من أي مبيد فطري آخر ويحتوي على مانكوزيب كمادة فعالة والتي تعطي قوة للنبات.

الاستعمال :

الفترة الآمنة (أيام)	معدل الاستعمال /_ لتر ماء	المرض	المحصول
٧	٤٥ - ٣٠ غم	اللفحات المبكرة والمتاخرة، الانثراكتون، تبعق الأوراق، البياض الزغبي، الأصداء، التبقع الزاوي.	الخيار، البندورة، البطاطا، البصل، الملفوف، البامية، الفاصولياء، الباذنجان، الفلفل.

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطف.

كيفية تحضير محلول الرش :

يتم تعبئة خزان الرش إلى منتصفه بالماء ثم تضاف كمية المبيد ويتم تعبئة الخزان بالماء مع استمرار التحريك.

الفترة بين الرشات :

يكسر الرش حسب الحاجة.

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والخشبية ما عدا مركبات الشiram، الكبريت القلوبي

ومركبات الــايثيوــكارباميت.