



المجموعة:  
Dithiocarbamate

# مانكوثين - ٨٠٪

مبيد فطري زراعي سام  
بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري لوقاية المحاصيل الوارد ذكرها في الجدول من الاصابه بالأمراض الفطرية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

**مانكوزيب**  
**الغواص:**

مانكوثين - ٨٠٪ : من انجح المبيدات الفطرية المستعملة لمكافحة مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية على البطاطا، البنودرة، البصل، الثوم، البازنجان، الفلفل، الخيار، الكوسا، البطيخ والنقاخ والاجاص كما يمكن رشه على الأوراق.

مانكوثين - ٨٠٪ غير سام للنباتات في ظروف استعماله.

مانكوثين - ٨٠٪ : يحسن النمو ويزيد الإنتاج لاحتوائه على الزنك والمنغنيز.

مانكوثين - ٨٠٪ : مبيد ثابت لا يتآثر بهطول الأمطار بعد الاستعمال.

## الاستعمال :

الفترة الآمنة (أيام)	وقت الرش	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
٥	يبدأ الرش عندما يصبح طول النبات ١٢-٧ سم أو عندما يظهر المرض.	٥٠ غم	اللفحة المبكرة، البياض الدقيق.	البطاطا.
٥	يبدأ الرش عند ظهور أول أعراض المرض في المنطقة ويكرر كل ١٠-٧ أيام.	٥٠ غم	اللفحة المبكرة، البياض الدقيق، تبعي الأوراق، الانثراكتوز.	البنودرة.
٧	يبدأ الرش عندما يكون النبات من ٦-٤ أوراق ويكرر بانتظام كل ١٠-٧ أيام.	٥٠ غم	البياض الرغبي، البياض الدقيق، العفن.	البصل، الثوم.
٥	يبدأ الرش عندما يصبح طول النبات ٢٠-١٢ سم أو عند بداية تكون الثمار. ويكرر الرش كل ٧-١٠ أيام.	٥٠ غم	اللفحات، الانثراكتوز.	البازنجان، الفلفل.
٥	عندما تبدأ النباتات بالامتداد، ويكرر الرش كل ١٠-٧ أيام.	٥٠ غم	البياض الرغبي، التبعي، الانثراكتوز.	الكوسا، الخيار، الشمام، البطيخ، اليقطين.
٥	يبدأ الرش عند ظهور أول أعراض المرض في المنطقة ويكرر بانتظام كل ١٠-٧ أيام.	٥٠ غم	البياض الرغبي، الصدأ، الانثراكتوز.	الفاصلوليا، الباذيلاء.



الفترة الآمنة (أيام)	وقت الرش	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
٢١	ابتداء من مرحلة انتفاخ البراعم ويكبر بانتظام كل ١٠-٧ أيام خلال مرحلة الطريوش الأخضر، الطريوش الأحمر والأزهار وسقوط توبيخات الزهر وحتى نهاية موسم الأمطار.	٥٠ غم	التبعع، مرض البقعة السوداء.	البنج، الأجاج، الكمشري، السفرجل.
٢١	ابتداء من منتصف أيام (لتجرب) وعند ظهور آثار العدوى (التبعع).	٣٠ - ٢٤ غم	الجرب، التبعع.	الحمضيات (الميلون، البرتقال، الجريب فروت)
٧	يبدأ الرش في المشتل عندما يكون النبات ورقتين محققيتين، أما في الحقل فيبدأ الرش بعد الزراعة ويكبر كل ٦-٥ أيام.	٣٠ - ٢٠ غم في أرض المشتل ٤٠ غم في الحقل	العنف الازرق.	التبغ.
٧	يبدأ الرش على النباتات المورقة ويستمر في الرش أسبوعيا طوال فصل النمو، ويفضل عمل رشتين أسبوعيا خلال موسم نفتح الأزهار للوقاية من المفعحة والعنف.	٥٠ غم	العنف، الصدأ، المفعحة، التبعع.	الزهور (الورد، القرنفل، الداليا، الجلاديولاس)

**تحذير :** عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.

#### فتررة تحرير دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

#### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفتيرية المعروفة ولا يخلط مع الكبريت.