

فايكو

المجموعة:

Anilinopyrimidine

هانجر - ٥٠٪

مبيد فطري زراعي سام
حببيات قابلة للانتشار في الماء



مبيد فطري جهازى يستخدم لمكافحة الأعفان على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٥٠٪ و / و (مادة فعالة)

سايبيرودينيل

الخواص :

هانجر- ٥٠٪ : مبيد فطري جهازى يستخدم لمكافحة الأعفان على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

هانجر- ٥٠٪ : مبيد فطري يتميز بسرعة تحليله في التربة.

الاستعمالات:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
المشمش، الدراق، النكتارين والخوخ	العفن البني و لفة الازهار (مرحلة الازهار)	١١,٢٥ غم	٣	ويعاد الرش بعد ٧-١٠ أيام من الرش الأولى
	عفن الثمار البني (نهاية الموسم)	٢٢,٥ غم ١١,٢٥ غم في حالة الخلط مع مادة الماليكوبوتانيل	٣	يتم الرش قبل الحصاد ب ١٠-١٤ يوم.
العنب	العفن الرمادي	٢٢,٥ غم	٧	• يبدأ الرش عند بداية الازهار فقط اذا كان الجو رطباً. • أهم وقت لرش المبيد عند بداية النضج للتثمار الى ما قبل الحصاد.

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- يمنع استعمال المبيد على أشجار الكرز.
- رج المحلول جيداً قبل البدء بعملية الرش لضمان انتشار المبيد جيداً في الماء.
- عند خلط المبيد هانجر- ٥٠٪ مع أي من المبيدات الأخرى فإنه يجب اضافة المبيد هانجر- ٥٠٪ أولاً والتأكد من انتشاره في الماء جيداً ثم يتم اضافة المبيدات الأخرى.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش :

- يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش لأشجار العنب .
- يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٧٢ ساعة على آخر معاملة رش لباقي المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

قابلية الخلط :

لا ينبغي خلط المبيد مع أي مادة غير مصرح بخلطها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى : فابنيل - ٥٠٪ .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.