

المجموعة:
Bipyridylum

هيريكل - ٢٠٪

مبيد زراعي عشبي عام / سام

مركز قابل للذوبان



مبيد عشبي غير اختياري يعمل بالملازمة لمقاومة الاعشاب الرفيعة والعريضة الاوراق في بساتين (الحمضيات، التفاح، الخوخ، المشمش، الدراق)، الموز وبين الاتلام في حقول الخضراوات، حقول قصب السكر وتجديد المراعي (الفصاة، تنظيف الحقل بعد الحصاد .

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و/ ح (مادة فعالة)

براكوات

(على صورة داي كلوريد البراكوات)

الخواص:

هيريكل - ٢٠٪: مبيد عام يعمل عن طريق الملازمة لمقاومة جميع أنواع الأعشاب الضارة.

هيريكل - ٢٠٪: مبيد يستعمل بعد إنبات الأعشاب ويفقد فعاليته في حالة ملازمته للتربة.

هيريكل - ٢٠٪: لا يوجد للمبيد أي تأثيرات سلبية على التربة لسرعة تكسره.

هيريكل - ٢٠٪: يمكن استخدامه لإعادة تجديد المراعي، وفي حصاد البطاطا.

الاستعمال:

امزج الكمية المطلوبة من هيريكل - ٢٠٪ مع ماء نظيف في خزان واستعمله كما يلي :

المحصول	الاعشاب	نسبة الاستعمال	ملاحظات
الحمضيات، التفاح، الخوخ، المشمش، الدراق، الموز.	الاعشاب الحولية و المعمرة	١,٥ - ٣ لتر / هكتار (١٠٠ - ٢٠٠ مل / لتر ماء)	لا يسبب ضررا عند الرش على لحاء ناضج ولكنه ضار عند الرش على الاجزاء الخضراء.
قبل زراعة النباتات وقبل ظهور المحاصيل: (الفاول، الخضار، الذرة، البصل)	والاعشاب عريضة الاوراق.	١,٥ - ٣ لتر / هكتار (١٠٠ - ٢٠٠ مل / لتر ماء)	---
بين صفوف الزرع: (الفاول، الخضار، الذرة، البصل)		١,٥ - ٣ لتر / هكتار (١٠٠ - ٢٠٠ مل / لتر ماء)	يفضل الرش قبل ان تبلغ الحشائش ١٠ سم. تجنب الرش على اوراق الزرع الاخضر ويوصى باستعمال واقي الرش.
الفصاة		١,٥ - ٣ لتر / هكتار (١٠٠ - ٢٠٠ مل / لتر ماء)	لا يجوز رش الفصاة الا بعد بلوغها ٦ اشهر. يرش المحلول قبل حلول السبات وبعد الحصاد او خلال ٢-٣ يوم من الحصاد.

هكتار = ١٠٠٠٠ م^٢

تحذير:

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه.



ارشادات :

- للحصول عل المفعول الأقصى: رش الأعشاب عندما يصبح طولها ١٥ سم او اقل و تأكد من رش الأعشاب الضارة بشكل شامل تماما.
- هيريكل - ٢٠% يقتل جميع الأنسجة الخضراء لذا تجنب حدوث اندفاع الرش مع الهواء ولا تدع الرذاذ يلامس أي أنسجة خضراء من المزروعات.
- استعمل النسب المنخفضة لمعالجة الأعشاب الضارة المتجددة النمو او الأعشاب الضارة الموجودة تحت ظل كثيف.
- استعمل النسب العالية للرش أول مرة أو عندما تكون الأعشاب الضارة كثيفة.
- يرش المبيد للسيطرة على الأعشاب الضارة قبل ظهور النباتات المزروعة رش المحلول تماما قبل الزراعة أو قبل ظهور المزروعات باستثناء التربة الرملية، حيث يوصى بفترة ٣ أيام ما بين الرش والزراعة.
- فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:** يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة من آخر معاملة.
- فترة تحريم الرعي للحيوانات:** يمنع رعي او تغذية الحيوانات في الحقل المرشوش لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة على الاقل على آخر معاملة .
- قابلية الخلط:** غير قابل للخلط مع غيره من المبيدات .