

المجموعة:
Benzimidazole

بينوميل - ٥٠٪



مبيد فطري جهازي سام / بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري جهازي ذو تأثير فعال على عدد كبير من الأمراض الفطرية التي تصيب التفاح، الاجاص، السفرجل، اللوزيات، العنب، الفراولة، الموز، البطاطا، البندورة، كوسا، خيار، بطيخ، شمام، فاصولياء، الورد ونباتات الزينة.

التركيب : كل غم يحتوي على :

٥٠٪ و/و (مادة فعالة)

بينوميل

الخواص :

بينوميل - ٥٠٪: مبيد فطري جهازي له تأثير فعال على عدد كبير من الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.
بينوميل - ٥٠٪: مردود أكيد وكفاءة عالية بتركيز قليل.
بينوميل - ٥٠٪: ذو تأثير فعال لحفظ المحاصيل بعد الجمع وأثناء التخزين دون أية تأثيرات سلبية.
بينوميل - ٥٠٪: ليس له تأثير سام على النحل.

الاستعمال :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	طريقة الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
التفاح، الاجاص، السفرجل، اللوز، المشمش.	البياض الدقيقي، الجرب، العفن البني، تبقع اوراق الكرز، المونيليا.	٦٠ غم/ ١٠٠ لتر ماء (١٢ غم / ٢٠ لتر ماء)	يبدأ الرش عند ظهور المرض ويعاد كل ١٠-١٤ يوما.	١٤ ٣
العنب	البياض الدقيقي.	٦٠ غم/ ١٠٠ لتر ماء (١٢ غم / ٢٠ لتر ماء)	المعالجة قبل الازهار. ويكرر الرش كل ١٠ - ١٤ يوم	٧
الفراولة	البياض الدقيقي، تبقع الاوراق، الذبول، عفن الجذور.	١٠٠ غم/ ١٠٠ لتر ماء (٢٠ غم / ٢٠ لتر ماء)	الرش عند ظهور المرض ويعاد كل أسبوعين. تغمر الفسائل لمدة ٢٥ دقيقة بمحلول بينوميل - ٥٠	٣
الموز	عفن الموز.	٨٠ غم/ ١٠٠ لتر ماء (١٦ غم / ٢٠ لتر ماء)	تغمر الثمار بعد الجمع لمدة ١٠ دقائق في محلول بينوميل - ٥٠ ثم يترك ليجف بعد الغمر.	---
البطاطا	البياض الدقيقي.	٨ غم/ ٢٠ لتر ماء	يبدأ الرش عند ظهور المرض ويكرر كل ١٠ - ١٤ يوم عند الحاجة	١٤
البندورة	العفن الطري، عفن الاوراق، العفن الابيض، تبقعات الاوراق.	٥ - ٦ غم / ٢٠ لتر ماء	---	٣
الكوسا، الخيار، البطيخ، الشمام.	انثراكنوز، البياض الزغبي، تبقع الاوراق.	٦٠ غم/ ١٠٠ لتر ماء (١٢ غم / ٢٠ لتر ماء)	يبدأ الرش عند ظهور المرض ويكرر كل ١٠ - ١٤ يوم	٣



المحصول	المرض	معدل الاستعمال	طريقة الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
الفاصولياء.	البياض الدقيقي.	١٢ غم / ٢٠ لتر ماء	يبدأ الرش عند ظهور المرض ويكرر كل ١٠ - ١٤ يوم	١٤
الورد، نباتات الزينة .	البياض الدقيقي، الجرب، العفن الرمادي، تبقع الاوراق.	١٢ غم / ٢٠ لتر ماء	يعاد كل ١٠-١٤ يوما طالما هناك حاجة لذلك.	---

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

ملحوظة : يمكن خلط بيتوميل - ٥٠ مع مادة لاصقة مثل (سوبرسيرفكس) تساعد المحلول على التوزيع المنتظم على النباتات التي يصعب بلها مثل الورود.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

يمكن خلطه مع كثير من المبيدات الفطرية والحشرية المعروفة.

ملاحظة : إن الرطوبة قد تسبب تغيرات كيميائية للمبيد تقلل من فاعليته ، لذلك يجب إغلاق العبوة بإحكام والحذر من تعريض المبيد للبلل أثناء التخزين.

* اسماء تجارية اخرى: بينوفاب - ٥٠ WP ، أقرونيل - ٥٠ WP .