

تتراميزول - 30

بودرة قابلة للذوبان في الماء

طارق للديدان المأمون الاستعمال والواسع الفعالية ضد الديدان الاسطوانية ويرقاتها في الحيوانات المختلفة

التركيب: كل غم يحتوي على:

تتراميزول هيدروكلورايد 300 ملغم

الخواص:

- التتراميزول: طارق الديدان الواسع الطيف وشديد الفعالية (مجموعة اميدوثيازول) ضد الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) في الجهاز الهضمي، وضد الديدان الرئوية في المجترات.
- علاج مأمون الاستعمال ضمن الجرعات المقررة، حتى للحيوانات الحوامل.
- يعمل على ائارة العقد العصبية للديدان والتي تؤدي الى تقلصات مستمرة للالياف العضلية فيها مما يسبب شللها وموتها.

الإستطبابات:

- معالجة و مكافحة اصابات الانواع المختلفة من الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي في المجترات والارانب والدواجن:
 - المجترات والارانب:
 - ديدان الجهاز الهضمي: الاسكاريس، نيماتودايريس، هيمونكس، كوبريا، اوسترتيجيا، ترايكويريس، سترونجيلويدس.
 - الديدان الرئوية: ديكتيوكولاس.
 - الدواجن:
 - اسكاريديا، هيتراكيس، كابيلاريا، اميدوستومم.

الجرعات :

- يعطى العلاج مع ماء الشرب او بالعلف.
- تعطى جرعة واحدة في كل مرة.
- الضأن والماعز والابقار والجمال:
 - 0.5 غم / 10 كغم وزن جسم، (15 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).
 - للوقاية: تكرر الجرعة كل 4-6 اشهر.
 - الدواجن والحمام والارانب:
 - 0.06 غم / كغم وزن جسم، (20 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).
 - تكرر المعالجة للدواجن والحمام كل ثلاثة اشهر، وللارانب مرتين في السنة.

فترة الامان :

- لاستهلاك اللحوم والبيض: اسبوع.
- لاستهلاك الحليب: يوم.

تنبيهات :

- تجنب معالجة الحيوانات الهزيلة او المريضة.
- يجب عدم استعمال المبيدات العضوية الفسفورية للحيوانات خلال (14) يوماً من المعالجة بالنتراميزول.
- قد يحدث احياناً في بعض الحيوانات، اسهال خفيف وسعال وزيادة في سيلان اللعاب.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة اقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.