

المجموعة:
Organotin Acaricide

جزار - ٢٥٪



مبيد حلم زراعي سام
مسحوق قابل للبلل

مبيد واسع المفعول يقضي على الحلم في اطواره المتحركة (اليرقات، الحوريات، الاطوار البالغة).

التركيب: كل كغم يحتوي على:

ازوسايكلوتين
٢٥٪ و/و (مادة فعالة)

الخواص:

جزار - ٢٥٪: لا يتاثر المبيد بالضوء والامطار : فهو مبيد ثابت وتستمر فعاليته لمدة طويلة.

جزار - ٢٥٪: مبيد حلم طويل المفعول يعمل بالملازمة لمكافحة كافة الاطوار المتحركة للحلم .

الاستعمال:

المحصول	الافه	معدل الاستعمال (غم/٢٠ لتر)	ملاحظات	فترة الامان (ايام)
الفاصولياء، الباميا، البازيلاء	الحلم الاحمر، الحلم ذو النقطتين	٢٠ - ٢٥ غم	---	٧
البندورة، الياذنجان، البطاطا، الخيار، الكوسا، الفلفل، الملفوف، الزهرة، الشمام، البطيخ، البصل، الثوم	الحلم الاحمر، الحلم ذو النقطتين	٢٠ - ٢٥ غم	---	٧
التفاح، الاجاص	الحلم الاحمر، الحلم ذو النقطتين	١٠ - ١٥ غم	• بداية الموسم (يستعمل بالتزامن مع عملية وضع البيوض)	١٥
		١٥ - ٢٠ غم	• منتصف ونهاية الموسم (يستعمل بالتزامن مع عملية وضع البيوض)	



المحصول	الافه	معدل الاستعمال (غم/٢٠ لتر)	ملاحظات	فترة الامان (ايام)
الدراق، المشمش، النكتارين، الخوخ، الكرز، اللوز	الحلم الاحمر، الحلم ذو النقطتين	١٠ - ١٥ غم	يستعمل بالتزامن مع عملية وضع البويض الصيفية	١٥
التوت، الفراولة	الحلم ذو النقطتين	١٥ غم	يستعمل في بداية ظهور الحلم وفي حالة الاصابة الشديدة يعاد الرش بعد ١٠- ١٤ يوم من المعاملة الاولى مع ضمان تغطية كاملة للمحصول (ويستعمل بعد ظهور البتلات او بعد الحصاد)	٧
الليمون، البرتقال، اليوملي، المندرين، جريب فروت	الحلم الاحمر	١٥ غم	يستعمل في بداية ظهور الحلم وفي حالة الاصابة الشديدة يعاد الرش بعد ١٠- ١٤ يوم من المعاملة الاولى مع ضمان تغطية كاملة للمحصول. لا يستعمل مع الزيوت او بعد ٢٨ يوم من استعمال الزيوت على النبات.	١٥
العنب	الحلم ذو النقطتين	١٥ - ٢٠ غم	يستعمل في بداية ظهور الحلم وفي حالة الاصابة الشديدة يعاد الرش بعد ١٠- ١٤ يوم من المعاملة الاولى مع ضمان تغطية كاملة للمحصول	١٥
نباتات الزينة وازهار القطف	الحلم الاحمر، الحلم ذو النقطتين	٢٠ - ٢٥ غم	---	---

تحذير: - عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

- لا يستعمل المبيد على الورد والكريزانثيم.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخطأ: قابل للخلط مع معظم المبيدات ماعدا المبيدات شديدة القلوية وينصح بعمل تجربة خلط قبل الاستعمال.