

المجموعة :
Inorganic compound (1)
Dithiocarbamate (2)

سلفات - ٥٣,٥ %



مبيد فطري بودرة قابلة للبلل

مبيد فطري وقائي يرش على الأوراق يعمل باللامسة، يستعمل للقضاء على العديد من الأمراض الفطرية مثل البياض الزغبي، اللفحات، تبقع الأوراق والجرب.

التركيب: كل كغم يحتوي على:

٣٧,٥ % (مادة فعالة)
١٦ % (مادة فعالة)

أوكسي كلوريد النحاس (1)
زِينب (2)

الخواص :

سلفات-٥٣,٥%: مبيد فطري وقائي يرش على الأوراق يعمل باللامسة، حيث يجب ان تتم الإضافة للمحاصيل قبل أن تبدأ الأبواغ الفطرية بالنمو.

سلفات-٥٣,٥%: يستعمل للقضاء على العديد من الأمراض الفطرية مثل البياض الزغبي، اللفحات، تبقع الأوراق والجرب.

سلفات-٥٣,٥%: يعتبر الزينب غير ضار للنباتات بشكل عام بإستثناء النباتات الحساسة للزنك مثل: التبغ والقثائيات، كذلك قد يتسبب حدوث ضرر لأوراق الخوخ والدراق خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة.

الاستعمال :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان (أيام)
الأشجار المثمرة	الجرب وتبقع الأوراق.	٦٠-٨٠ غم	١٥
البطاطا	اللفحة المتأخرة.	٥٠ غم	٧
البندورة	اللفحة المتأخرة، البياض الزغبي.	٤٠-٦٠ غم	٧

تحذير: عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة اعلاه مع الالتزام بفترات الامان قبل عملية القطف .

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة .

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مبدئية .