

فايكوسيدين - 20 %

مبيد حشري ومبيد للحلم
مركز مستحلب

التركيب: كل لتر يحتوي على:

200 غم

فينفاليريت

الخواص:

- مبيد حشري ومبيد للحلم غير جهازي، ويعمل بالملامسة وعن طريق المعدة.
- يقضي على مجموعة واسعة من الطفيليات الخارجية خاصة تلك التي لا تتأثر بالانواع الاخرى من المبيدات.
- فعال ضد الطفيليات وبويضاتها وبرقاتها، وذلك من خلال جرعات منخفضة.
- ذو سمية متدنية للثدييات.
- يتميز بقوة طاردة للحشرات.

الاستعمالات:

- معالجة اصابات الجرب المختلفة ومكافحة الطفيليات الخارجية مثل القراد والقملة التي تهاجم الضأن والماعز والابقار والجمال.
- مكافحة ذباب الابقار والاسطبلات والزرائب ومزارع الدوجن وكذلك الحشرات الزاحفة فيها.
- يقضي على يرقات الذباب عند رشه على اماكن تولدها.

طريقة الاستعمال: بالرش او التغطيس بعد التخفيف بالماء كما يلي:

فترات الاستعمال	نسبة التخفيف بالماء	الاستعمال
اسبوعياً او عند الضرورة	2500:1	التغطيس
	التعويض 1300:1	
	200:1	الرش
	100 مل / 20 لتر ماء	
100:1	الزرائب والاسطبلات	

تحذيرات:

- سام للأسماك والنحل.
- تجنب معالجة الحيوانات المريضة والمنهكة والضعيفة وصغيرة السن.
- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد والاستنشاق.
- قبل الرش، ينبغي ارتداء الملابس والاحذية والقفازات والنظارات الواقية.
- تجنب الاكل والشرب والتدخين اثناء عملية الرش.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- لا يسمح للمواليد برضاعة امهاتها بعد التغطيس او الرش بالمبيد الحشري الا بعد ان تجف الامهات تماماً من محلول المبيد.
- لا تخط فابكوسيدين مع المبيدات الاخرى.

الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
 - تجنب اجراء التقيؤ .
 - اجراء غسيل معدة.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاوكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

الترياق المضاد:

- غير محدد، وتتم المعالجة حسب الاعراض.
- في حالة حدوث التشنجات، يعطى المريض ديازيبام.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: يومان.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات:

- (100، 250) مل.
- (1، 5، 20) لتر.