

فابكو

المجموعة :

Carbamate
Fungicide

بروبوريد - ٧٢,٢ %

مبيد فطري زراعي سام
مركز قابل للذوبان

مبيد فطري جهازى له تاثير وقائى وعلاجى لمقاومة فطريات التربة والعديد من الامراض الفطرية على المحاصيل الواردة في الجدول .

التركيب : كل لتر يحتوي على :

بروباموكارب هيدروكلورايد ٧٢,٢ % و / ح (مادة فعالة)

الخواص:

بروبوريد - ٧٢,٢ % : مبيد فطري جهازى له تاثير وقائى وعلاجى لمقاومة فطريات التربة و العديد من الأمراض الفطرية على المحاصيل الواردة في الجدول.
بروبوريد - ٧٢,٢ % : له فعالية تدوم من ٣ - ٨ أسابيع وذلك حسب طريقة الاستعمال، الظروف الجوية ونوع التربة وينصح باستعماله بشكل مبكر ووقائى.
بروبوريد - ٧٢,٢ % : خفيف السمية للنحل والأسماك.

الاستعمال:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
البندورة، الملفوف، الفجل والبطاطا	عفن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا)، البياض الزغبي واللفحة المتأخرة: (فيتوفثورا)	<u>معاملة البذور:</u> يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول / ٢م. <u>معاملة الأشتال:</u> • قبل نقل الأشتال : يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول / ٢م. • بعد نقل الاشتال: يضاف المحلول ٢٠ مل / ٢٠ لتر الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول / شتلة (ويعاد الرش كل أسبوعين عند الحاجة). الرش الورقي : ٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء.	٧ أيام عدا الملفوف ١٤ يوم

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الخيار	عفن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا) البياض الزغبى	معاملة البذور: يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول /م^٢. معاملة الأشتال: • قبل نقل الأشتال : يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول /م^٢. • بعد نقل الاشتال: يضاف المحلول ٢٠ مل / ٢٠ لتر الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول /شتلة . <u>الرش الورقي :</u> ٥٠ مل / ٢٠ لتر	٣ أيام
الفاصل الحلو الخس السيانخ	عفن الجذور (بيثيوم)، البياض الزغبى التصمغ (فيتوفثورا)	معاملة البذور: يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٦ لتر من المحلول /م^٢. معاملة الأشتال: • قبل نقل الأشتال بيومين الى أربعة أيام: يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٦ لتر من المحلول /م^٢ ثم تزرع الأشتال. • بعد نقل الأشتال بيومين الى أربعة أيام : يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول /شتلة (ويعاد الرش كل اسبوعين عند الحاجة). <u>الرش الورقي :</u> ١,٥ لتر /هكتار (٦٠٠ - ١٠٠٠ لتر ماء) يرش عند بداية الاصابة ويكرر الرش كل ٧ - ١٠ أيام على ان لا تتعدى عدد الرشات عن ٤ خلال الموسم.	١٤ يوم ٢١ يوم ١٤ يوم

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديثات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الشمام	عفن الجذور	<u>معاملة الأشتال:</u> • بعد نقل الاشتال : يضاف محلول الرش (٥٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بمعدل ٢٠ - ٢٥ مل من المحلول / جورة. (ويعاد الرش بعد ١٥ يوم).	٧ أيام
	البياض الزغبي	<u>الرش الورقي :</u> ٥٠ مل/ ٢٠ لتر ماء ويجب تغطية النبات جيدا بمحلول الرش.	
البصل	عفن الجذور: (بيثيوم) البياض الزغبي التصمغ (فيتوفثوا)	<u>معاملة البذور:</u> يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٦ لتر من المحلول / م^٢. <u>معاملة الأشتال:</u> • قبل نقل الأشتال بيومين الى أربعة ايام: يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٦ لتر من المحلول / م^٢ ثم تزرع الأشتال. • بعد نقل الاشتال بيومين الى أربعة ايام : يضاف محلول الرش (٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول / شتلة (ويعاد الرش كل أسبوعين عند الحاجة). <u>الرش الورقي :</u> ١,٥ لتر / هكتار (٦٠٠ - ١٠٠٠ لتر ماء) يرش عند بداية الاصابة ويكرر الرش كل ٧ - ١٠ أيام على ان لا تتعدى عدد الرشات عن ٤ خلال الموسم.	١٤ يوم

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديثات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
نباتات الزينة	عفن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا)	<u>معاملة البذور:</u> يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول / م^٢. <u>معاملة الأشتال:</u> • قبل نقل الأشتال : يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢ - ٤ لتر من المحلول / م^٢. • بعد نقل الاشتال: يرش المحلول ٢٠ مل / ٢٠ لتر الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول / شتلة. <u>العقل:</u> يرش المحلول (٥ - ١٥ مل / ١٠ لتر) الى التربة بمعدل ٥ - ١٠ لتر من المحلول / م^٢.	---

تحذير :

لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الجدول مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية ولا يخلط مع الأسمدة المذابة في الماء ويفضل استعمال المبيد فوراً بعد الخلط وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية.