

فابكو

المجموعة:

Dinitroaniline

بنديلين - ٤٠٪

مبيد عشبي زراعي سام

مركز معلق

مبيد عشبي اختياري لمكافحة الاعشاب الحولية والاعشاب عريضة الاوراق على المحاصيل الزراعية الواردة بالجدول.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

بنديماتلين

الخواص :

٤٠٪ و / ح (مادة فعالة)

بنديلين- ٤٠٪ : مبيد عشبي اختياري يمتص عن طريق الاوراق والجذور.

بنديلين- ٤٠٪ : يقضي على الاعشاب الحولية رفيعة الاوراق والاعشاب عريضة الاوراق.

بنديلين- ٤٠٪ : يستعمل قبل الزراعة وقبل الانبات وقبل نقل الاشغال او في وقت مبكر بعد الانبات على مدى واسع من المحاصيل المذكورة بجدول الاستعمال.

الاستعمال :

المحصول	موعد الرش	معدل الاستعمال (مل / دونم)	ملاحظات
القمح الشتوي، الشعير الشتوي	قبل انبات المحصول	٣٣٠	- لا يستعمل على المحاصيل بعد نهاية شهر تشرين الثاني.
الشعير الربيعي، قصب السكر	قبل انبات المحصول	٣٣٠	- يستعمل بعد الزرع وقبل الانبات. - لا يستعمل المبيد بنديلين- ٤٠٪ بعد نهاية شهر اذار الا في حال توفر الامطار.
البصل، الكراث	قبل انبات المحصول وقبل نقل الاشغال	٣٣٠	- يستعمل بعد الزرع وقبل انبات المحصول والاعشاب. - معاملة الاشغال (يستعمل قبل نقل الاشغال). - لا يستعمل في حال توقع هطول كمية كبيرة من الامطار.
الجزر	قبل انبات المحصول	٣٣٠	- يستعمل بعد الزرع وقبل انبات المحصول والاعشاب.
الزهرة، الملفوف، البروكلي	قبل التشثيل	٣٣٠	- يستعمل بعد تحضير الاتلام وقبل نقل الاشغال. - لا يستعمل بعد الزراعة فقد يسبب ضرر بالنباتات. - لا يستعمل على اشغال القرعيات في حال توقع هطول كمية كبيرة من الامطار.
البطاطا	قبل انبات المحصول	٣٣٠	- يستعمل مباشرة بعد الزراعة. - لا يستعمل قبل ٧ ايام من الانبات.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	موعد الرش	معدل الاستعمال (مل / دونم)	ملاحظات
الفاولة	بعد التزهير وقبل ظهور العنقود الثمري	٣٣٠	- يستعمل على المزروعات الحديثة في فصل الخريف واوائل فصل الربيع بعد الزراعة وقبل انبات الاعشاب. - لا يستعمل قبل الزراعة.
الأجاص، التفاح، الخوخ، الكرز	قبل تفتح البراعم	٣٣٠	- يستعمل خلال فصل الخريف واوائل فصل الربيع. - لا يستعمل المبيد بنديلين- ٤٠ % بعد نهاية شهر اذار الا في حال توفر رطوبة مناسبة للتربة.

تحذير:

لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

ارشادات :

- يتم تخفيف المبيد بكمية من الماء لا تقل عن ١٠٠-٢٠٠ لتر/هكتار.
- عند تطبيق المبيد بنديلين- ٤٠ % يفضل ترطيب التربة جيدا ويعطي المبيد افضل فعالية عند توفر رطوبة كافية بالتربة وتسجل افضل النتائج عندما تهطل الامطار خلال ٧ ايام من المعالجة .
- لا يستخدم المبيد بنديلين- ٤٠ % على المحاصيل اذا كانت تعاني من الاجهاد.
- يجب ان تزرع البذور على عمق ٢-٣ سم .
- يمنع خلط التربة بعد استخدام المبيد بنديلين- ٤٠ % لان ذلك يقلل من مكافحة الاعشاب.
- لا يرش المبيد في حال نثر البذور.
- لا يستخدم المبيد بنديلين- ٤٠ % على المحاصيل المحمية او في البيوت المحمية
- لا يستخدم المبيد بنديلين- ٤٠ % على التربة التي تحتوي على نسبة من المواد العضوية اكثر من ١٠ %.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

لا ينصح بدخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر معاملة.

فترة تحريم دخول الحيوانات للرعي:

لا يسمح بالرعي إلا بعد مرور ٢٤ ساعة من معاملة الحقل بالمبيد.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع غيره من المبيدات او الاسمدة.