



PYROXEN-10% ЕС ПИРОКСЕН-10% КЭ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

ИНСЕКТИЦИД КИШЕЧНО- КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ ГРУППЫ АНАЛОГОВ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА; ПОДАВЛЯЕТ МОРФОГЕНЕЗ, РАЗМНОЖЕНИЕ И ЭМБРИОГЕНЕЗ НАСЕКОМЫХ.

СОСТАВ:

КАЖДЫЙ 1 ЛИТР ПИРОКСЕН - 10% СОДЕРЖИТ:

ПИРИПРОКСИФЕН

**10,0% вес / объем
(активного вещества)**

КОММЕРЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ПИРОКСЕН-10% КЭ: РЕГУЛЯТОР РАЗВИТИЯ НАСЕКОМЫХ, КОТОРЫЙ ПОДАВЛЯЕТ ПРОЦЕССЫ СОЗРЕВАНИЯ НАСЕКОМЫХ.

ПИРОКСЕН-10% КЭ: ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ (БЛОХИ И ТАРАКАНЫ) В БЫТУ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ДОЗЕ ПРЕПАРАТА).

ПИРОКСЕН-10% КЭ: МАЛОТОКСИЧЕН ДЛЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

МЕСТА ОБРАБОТОК	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	КРИТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
ДОМА, КВАРТИРЫ, ЗАВОДЫ, МАГАЗИНЫ, СКЛАДЫ, РЕСТОРАНЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ.	БЛОХИ	<u>ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА:</u> ВОДА 20 МЛ / 20 Л ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ БАКОВОЙ СМЕСИ С ЭТИКЕТКОЙ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА НАЛИЧИЕ ИНСЕКТИЦИДА, УБИВАЮЩЕГО ВЗРОСЛЫХ НАСЕКОМЫХ. <u>ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА:</u> 20 МЛ / 20 Л ВОДЫ, НАНОСИТЬ ОТДЕЛЬНО.	ГРУБОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ПРИ НОРМЕ РАСХОДА 5 Л /100 М²; НОРМА РАСХОДА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПРИРОДЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНЯТЬ ПОВТОРНО, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ.



	ТАРАКАНЫ	40 МЛ / 20 Л ВОДЫ, ПРИМЕНЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ БАКОВОЙ СМЕСИ С ЭТИКЕТКОЙ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА НАЛИЧИЕ ИНСЕКТИЦИДА, УБИВАЮЩЕГО ВЗРОСЛЫХ НАСЕКОМЫХ.	
--	----------	---	--

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЕ ДО 24 ЧАСОВ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К УКАЗАТЕЛЮ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.