

PROPORID 72.2% ПРОПОРИД 72.2%

Класс:
Карбаматы

ФУНГИЦИД РАСТВОРИМЫЙ КОНЦЕНТРАТ

Системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием, используемый для борьбы с почвенными грибами и грибковыми заболеваниями на культурах, упомянутых в таблице применения.

СОСТАВ: Каждый литр содержит:

ПРОПАМОКАРБ ГИДРОХЛОРИД

**72,2% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ПРОПОРИД-72,2%: Системный фунгицид с профилактическим и лечебным защитным действием, используемый для борьбы с почвенными грибами и грибковыми заболеваниями на сельхозкультурах.

ПРОПОРИД-72,2%: имеет длительную остаточную активность в течение 3 - 8 недель; действие препарата зависит от температуры, освещенности и типов почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

| КУЛЬТУРА | ЗАБОЛЕВАНИЕ | СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД |
|--|---|--|--|
| Помидоры, капуста, редька и картофель | Корневая гниль (<i>Питиум</i> и <i>Фитофтора</i>) | Посев семян: Сразу после посадки добавить 70 мл / 20 л воды и обработать поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м ² . | 7 дней, за исключением капусты 14 дней |
| | Ложная мучнистая роса | Теплица: • Перед пересадкой: добавить 70 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м ² . | |

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | <p>• После пересадки: добавить 20 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 200 мл (раствор) / растение, повторяя каждые две недели по мере необходимости.</p> <p>Лиственный спрей: 30 мл / 20 л воды</p> | |
| | Ранняя гниль (Фитофтора) | | |
| КУЛЬТУРА | ЗАБОЛЕВАНИЕ | СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД |
| Огурец | <p>Корневая гниль (Питиум и Фитофтора)</p> <p>Ложная мучнистая роса</p> | <p>Посев семян: Непосредственно после посадки добавить 70 мл / 20 л воды к поверхности почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м².</p> <p>Теплица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • перед пересадкой: Добавить 70 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 2-4 л (раствор) / м². • После пересадки: Добавить 20 мл / 20 л воды на поверхность почвы со скоростью 200 мл (раствор) / растение, повторяя каждые две недели по мере необходимости. <p>Лиственный спрей: 50 мл / 20 л воды.</p> | 3 дня |
| Декоративное растение | Корневая гниль (Питиум и Фитофтора) | <p>Посев семян и Теплица: Использовать и применять так же, как указано выше.</p> <p>Резка: Добавить 5-15 мл / 10 л воды на поверхность почвы со скоростью 5 - 10 л (раствор) / м².</p> | --- |

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на выше указанных культурах и следовать рекомендованному безопасному периоду перед сбором урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных пестицидов, несовместимых с жидкими удобрениями; рекомендуется смешивать **ПРОПОРИД** с водой, а затем добавить другой пестицид перед смешиванием.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.