

فا بكو

المجموعة:
anilinopyrimidine
phenylpyrrole

بروكسنيل-62.5%

مبيد فطري زراعي سام
حبيبات قابلة للانتشار في الماء

مبيد فطري جهازى ووقائى طويل الامد لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمال

التركيب : كل كغم يحتوى على :

سايبرودينيل 37.5% و/و (مادة فعالة)
فلديوكسونيل 25.0% و/و (مادة فعالة)

الخواص:

بروكسنيل-62.5% : مبيد فطري جديد يستخدم لمكافحة الاعفان، اللفحات، تبقع الاوراق ، البياض الدقيقي على مدى واسع من المحاصيل الزراعية.
بروكسنيل-62.5% : ذو تركيبة مميزة من المادتين (سايبرودينيل و فلديوكسونيل) للقضاء على الاعفان التي تصيب محصول العنب، الفاصوليا، البطاطا، الكرفس، الخس، البقدونس، السبانخ، البصل، الثوم، البندورة، الباذنجان، الفلفل، الباميا، افوكادو، جوافه، مانجا، الحمضيات، الفراولة.
بروكسنيل-62.5% : مبيد ذو فعالية عالية طويلة الامد.

الاستعمالات:

المحصول	الأفء	نسبة الاستعمال لتر ماء / 20	فترة الأمان (يوم)
الفاصولياء	العفن الابيض، العفن الرمادي	15- 20 غم	7
البطاطا	العفن البني، اللفحة المبكرة، تبقع الاوراق السبتوري، البياض الدقيقي	15- 20 غم	14
البروكلي، الملفوف، الزهره، الخردل، الكرنب	البياض الدقيقي	10- 17 غم	7
	لفحة الالترناريا، تبقع الاوراق	15- 20 غم	
الخيار، البطيخ، الشمام، القرع، الكوسا	لفحة الالترناريا، تبقع الاوراق، لفحة الساق، البياض الدقيقي	15- 20 غم	7
الكرفس، الخس، البقدونس، السبانخ	لفحة الالترناريا، تبقع الاوراق، الاعفان، البياض الدقيقي	15- 20 غم	7
الشمندر، الجزر، الفجل، اللفت، البطاطا الحلوه	لفحة الالترناريا، البياض الدقيقي	15- 20 غم	7

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

7	15-20 غم	لفحة الاوراق، اللطخات، عفن الرقبه، العفن الاسود	البصل، الثوم
7	10-20 غم (تتم المعاملة عند زراعة ورشاً بين الاتلام)	امراض التربة: العفن الابيض	
7	15-20 غم	اللفحه المبكره، العفن الرمادي، البياض الدقيقي، التبقع الزاوي	البندورة، الباذنجان، الفلفل، الباميا
21	15-20 غم	عفن ثمار، تبقع الاوراقن الانثراكنوز	افوكادو، جوافه، مانجا
21	15-20 غم	عفن الساق، الانثراكنوز، العفن الازرق، العفن الرمادي	الحمضيات (ليمون، برتقال، مندلينا، بوملي، الجريب فروت)
14	15-20 غم	الاعفان	العنب
14	15-20 غم	العفن الرمادي، البياض الدقيقي، الانثراكنوز	الفراولة

معاملة بعد الحصاد:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	ملاحظات
الرمان	عفن الثمار، العفن الرمادي	29 غم/1 لتر	تغطس الثمار لمدة 30 ثانية في محلول الرش ثم تترك حتى جفاف المحلول .

تحذير:

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية الحصاد.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الورقية وينصح بعمل تجربة مصغرة قبل الخلط.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور 24 ساعة على آخر معاملة.