



HANGER-50% WDG

ХАНГЕР-50% ВГ

ФУНГИЦИД ВОДРАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛЫ

**СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПРОТИВ ПАРШИ, ГНИЛИ И МУЧНИСТОЙ РОСЫ.**

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ЦИПРОДОНИЛ

**50,0% вес / вес
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ХАНГЕР-50% ВГ: СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД, ПОПАДАЮЩИЙ В РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ И ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В ТКАНИ И АКРОПЕТАЛЬНО В КСИЛЕМУ, ИНГИБИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ И МИЦЕАЛЬНЫЙ РОСТ ВНУТРИ И НА ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТА.

ХАНГЕР-50% ВГ: ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С ПАРШОЙ НА ЯБЛОНЯХ, ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ И КОРИЧНЕВАЯ ГНИЛЬ НА КОСТОЧКОВЫЙ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ, И СЕРАЯ ГНИЛЬ НА ВИНОГРАДЕ.

ХАНГЕР-50% ВГ: БЫСТРО РАЗРУШАЕТСЯ В ПОЧВЕ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНЬ / СРОКИ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА (Г /20 Л ВОДЫ)	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)	ВНИМАНИЕ
ЯБЛОНИ	ПАРША / (ДО ЭТАПА ЦВЕТЕНИЯ)	11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ)	21	ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА ЗЕЛЕННЫХ ПОБЕГОВ
	ПАРША/ ДО ЦВЕТЕНИЯ, В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ, ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.	6.0 (60 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МЕТИРАМ ИЛИ МАНКОЗЕБ)		ВТОРАЯ ОБРАБОТКА - ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
	ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА/ ДО ЦВЕТЕНИЯ, ПОСЛЕ ЭТАПА ЦВЕТЕНИЯ.	6.0 (60 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МИКЛОБУТАНИЛ)		
АБРИКОСЫ, НЕКТАРИНЫ, ПЕРСИКИ, СЛИВЫ И ЧЕРНОСЛИВЫ	БУРАЯ ГНИЛЬ И ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ / (ЭТАП ЦВЕТЕНИЯ)	11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ)	2	ВТОРАЯ ОБРАБОТКА- ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ОБРАБОТКИ
	ФРУКТОВАЯ БУРАЯ ГНИЛЬ / (ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН)	22.5 (225 Г/200 Л ВОДЫ) 11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МИКЛОБУТАНИЛ)		ПРИМЕНЯТЬ ЗА 10-14 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ
ВИНОГРАД	СЕРАЯ ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ	22.5 (225 Г/200 Л ВОДЫ)	7	НАЧАЛО ОБРАБОТКИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЦВЕТЕНИЯ, ЕСЛИ ВЛАЖНАЯ ПОГОДА. НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ОБРАБОТКУ ПРОВОДЯТ НА РАННЕМ СРОКЕ СОЗРЕВАНИЯ ДО СБОРА УРОЖАЯ.



ПРИМЕЧАНИЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ЯБЛОНЯХ, КОСТОЧКОВЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ И ВИНОГРАДЕ
- **НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИШНИ**
- ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТА НЕОБХОДИМО ЭНЕРГИЧНОГО ПЕРЕМЕШИВАТЬ
- ЕСЛИ В БАКЕ НАХОДИТСЯ СМЕСЬ СМАЧИВАЕМОГО ПОРОШКА, ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГРАНУЛ, СУХОГО КОМПОЗИТА, ЖИДКОГО КОМПОЗИТА ИЛИ КОНЦЕНТРАТА ЭМУЛЬСИИ, ДОБАВИТЬ **ХАНГЕР-50%** И РАЗМЕШАТЬ, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ДРУГОЙ ПРОДУКТ.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

- 72 ЧАСА ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЯБЛОНЬ И КОСТОЧКОВЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
- 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ ВИНОГРАДА

УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЯ:

НЕ ФИТОТОКСИЧЕН, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННУЮ НОРМУ РАСХОДА. НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ВИШНЯХ.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

НЕ СМЕШИВАТЬ С ПРОДУКТАМИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕМИНЕНИЮ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТ ТАКОЕ СМЕШИВАНИЕ.