

ISO 9001 & 14001 REGISTERED



**VAPCO**  
**VETERINARY & AGRICULTURAL**  
**PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



## **HANGER-50% WDG**

## **ХАНГЕР-50% ВГ**

### **ФУНГИЦИД ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛЫ**

**СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
ПРОТИВ ПАРШИ, ГНИЛИ И МУЧНИСТОЙ РОСЫ.**

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**ЦИПРОДОНИЛ**

**50,0% вес / вес  
(активного вещества)**

**СВОЙСТВА:**

**ХАНГЕР-50% ВГ:** СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД, ПОПАДАЮЩИЙ В РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ И ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ В ТКАНИ И АКРОПЕТАЛЬНО В КСИЛЕМУ, ИНГИБИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ И МИЦЕАЛЬНЫЙ РОСТ ВНУТРИ И НА ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТА.

**ХАНГЕР-50% ВГ:** ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С ПАРШОЙ НА ЯБЛОНЯХ, ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ И КОРИЧНЕВАЯ ГНИЛЬ НА КОСТОЧКОВЫЙ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ, И СЕРАЯ ГНИЛЬ НА ВИНОГРАДЕ.

**ХАНГЕР-50% ВГ:** БЫСТРО РАЗРУШАЕТСЯ В ПОЧВЕ.



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	БОЛЕЗНЬ / СРОКИ	НОРМА РАСХОДА (Г /20 Л ВОДЫ)	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)	ВНИМАНИЕ
ЯБЛОНИ	ПАРША / (ДО ЭТАПА ЦВЕТЕНИЯ)	11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ)	21	ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА ЗЕЛЕННЫХ ПОБЕГОВ  ВТОРАЯ ОБРАБОТКА - ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
	ПАРША/ ДО ЦВЕТЕНИЯ, В ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ, ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.	6.0 (60 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МЕТИРАМ ИЛИ МАНКОЗЕБ)		
	ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА/ ДО ЦВЕТЕНИЯ, ПОСЛЕ ЭТАПА ЦВЕТЕНИЯ.	6.0 (60 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МИКЛОБУТАНИЛ)		
АБРИКОС, НЕКТАРИНЫ, ПЕРСИКИ, СЛИВЫ И ЧЕРНОСЛИВ	БУРАЯ ГНИЛЬ И ФИТОФТОРОЗ СОЦВЕТИЙ / (ЭТАП ЦВЕТЕНИЯ)	11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ)	2	ВТОРАЯ ОБРАБОТКА- ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ОБРАБОТКИ  ПРИМЕНЯТЬ ЗА 10-14 ДНЕЙ ДО СБОРА УРОЖАЯ
	ФРУКТОВАЯ БУРАЯ ГНИЛЬ / (ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН)	22.5 (225 Г/200 Л ВОДЫ)  11.25 (112.5 Г/200 Л ВОДЫ) ПРИ СМЕШИВАНИИ С (МИКЛОБУТАНИЛ)		
ВИНОГРАД	СЕРАЯ ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ	22.5 (225 Г/200 Л ВОДЫ)	7	НАЧАЛО ОБРАБОТКИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ЦВЕТЕНИЯ, ЕСЛИ ВЛАЖНАЯ ПОГОДА.  НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ОБРАБОТКУ ПРОВОДЯТ НА РАННЕМ СРОКЕ СОЗРЕВАНИЯ ДО СБОРА УРОЖАЯ.



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ЯБЛОНЯХ, КОСТОЧКОВЫХ ФРУКТОВЫХ ДКРКВЬЯХ И ВИНОГРАДЕ
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВИШНИ
- ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДУКТА НЕОБХОДИМО ЭНЕРГИЧНОГО ПЕРЕМЕШИВАТЬ
- ЕСЛИ В БАКЕ НАХОДИТСЯ СМЕСЬ СМАЧИВАЕМОГО ПОРОШОКА, ВОДОРАСТВОРИМЫХ ГРАНУЛ, СУХОГО КОМПОЗИТА, ЖИДКОГО КОМПОЗИТА ИЛИ КОНЦЕНТРАТА ЭМУЛЬСИИ, ДОБАВИТЬ **ХАНГЕР-50%** И РАЗМЕШАТЬ, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ ДРУГОЙ ПРОДУКТ.

**ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

- 72 ЧАСА ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЯБЛОНЬ И КОСТОЧКОВЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
- 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ ВИНОГРАДА

**УСТОЙЧИВОСТЬ УРОЖАЯ:**

НЕ ФИТОТОКСИЧЕН, ЕСЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННУЮ НОРМУ РАСХОДА. НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ВИШНЯХ.

**СОВМЕСТИМОСТЬ:**

НЕ СМЕШИВАТЬ С ПРОДУКТАМИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕМИНЕНИЮ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТ ТАКОЕ СМЕШИВАНИЕ.