

МЕСТАТОР 39.1% SE МЕСТАТОР 39.1% СЭ

ФУНГИЦИД СУСПО-ЭМУЛЬСИЯ

Класс:
1. Метоксиакрилаты
2. Ацилаланины

Системный фунгицид, эффективный для профилактики почвенных болезней у растений.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

АЗОКСИСТРОБИН

28,2% вес / объем
(активного вещества)

МЕТАЛАКСИЛ-М

10,9% вес / объем
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

МЕСТАТОР 39,1%: комплекс АЗОКСИСТРОБИНА и соединения МЕТАЛАКСИЛ-М (мефеноксам), используется для борьбы с болезнями, передаваемыми через почву, различными овощами и полевыми культурами.

МЕСТАТОР 39,1%: Используется для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как ризоктониозная гниль всходов (*rhizoctonia solani*), увядание (*pythium*), корневая гниль на большом количестве сельскохозяйственных культур.

МЕСТАТОР 39,1%: системный фунгицид, предназначенный для профилактики и контроля широкого спектра грибковых заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА /20 Л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД
Чеснок, лук, лук-порей	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	0 дней
Мускусная дыня, арбузы, огурцы, тыква, кабачок	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	0 дней

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Сельдерей, салат, петрушка, шпинат, мангольд	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	36 дней
Бобы, нут, чечевица, горох, бобы	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	0 дней
Свекла, редька, сладкий картофель, репа	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	0 дней
Брокколи, капуста, горчица	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль	13.2 мл (пропитка)	36 дней
Помидор, перец	Ризоктониозная гниль всходов (<i>rhizoctonia solani</i>), увядание (<i>pythium</i>), корневая гниль, стеблевая гниль	20- 30 мл (пропитка)	0 дней

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.
- Продукт чрезвычайно фитотоксичен для некоторых сортов яблонь, поэтому не распылять его вблизи плодов.
- Применять фунгицид только один раз за сезон.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

12 часов с момента последнего опрыскивания.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.