



**VAPCO**  
**VETERINARY & AGRICULTURAL**  
**PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.**



**МЕТАВАР- 24% SC**  
**МЕТАВАП-24% КС**  
**ИНСЕКТИЦИД**  
**КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ**

**ИНСЕКТИЦИД ОКАЗЫВАЕТ КИШЕЧНО-КОНТАКТНОЕ ДЕЙТВИЕ НА ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ, ВЫСОКО ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР**

**СОСТАВ:** каждый литр содержит:

**МЕТАФЛУМИЗОН**

**24,0% вес / объем**  
**(активного вещества)**

**СВОЙСТВА:**

**МЕТАВАП-24% КС:** СОДЕРЖИТ МЕТАФЛУМИЗОН, КОТОРЫЙ БЛОКИРУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ НАСЕКОМОГО, ЧТО ПРИВОДИТ К ПАРАЛИЧУ И СМЕРТИ ВРЕДИТЕЛЯ.

**МЕТАВАП-24% КС:** СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, ВРЕДИТЕЛИ ПРЕКРАЩАЮТ ПИТАТЬСЯ.

**МЕТАВАП-24% КС:** ВЫЗЫВАЕТ ПАРАЛИЧ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАСЕКОМЫХ И СМЕРТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1 - 72 ЧАСОВ.



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

| КУЛЬТУРА                                 | ВРЕДИТЕЛЬ                                                                                        | НОРМА<br>РАСХОДА<br>мл /20 л<br>ВОДЫ | ИНСТРУКЦИЯ ПО<br>ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                                                             | Максималь<br>ное<br>количество<br>обработок /<br>вегетацион<br>ный период | БЕЗОПА<br>СНЫЙ<br>ПЕРИОД<br>(ДНИ) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Картофель</b>                         | Колорадский<br>жук                                                                               | 5 мл                                 | Распылять инсектицид в<br>начале личиночной стадии,<br>на ранней стадии роста<br>растений.                                                                              | 3                                                                         | 14                                |
| <b>Помидор<br/>(теплица)</b>             | Томатная<br>зеленая<br>гусеница,<br>совка,<br>томатная<br>минирующая<br>моль "Tuta<br>absoluta"  | 20 мл                                | - Опрыскивать в начале<br>личиночной стадии, на<br>ранней стадии роста<br>растений.<br>- В случае сильного<br>заражения повторить<br>опрыскивание через 7 - 10<br>дней. | 2                                                                         | 7                                 |
| <b>Помидор<br/>(открытый<br/>грунт)</b>  | Зеленая<br>гусеница,<br>паутинный<br>клещ, <i>Heliothis<br/>Spp.</i><br>(коробочковы<br>й червь) | 15 - 20 мл                           | - Опрыскивать в начале<br>личиночной стадии, на<br>ранней стадии роста<br>растений.<br>- В случае сильного<br>заражения повторить<br>опрыскивание через 7 - 10<br>дней. | 2                                                                         | 7                                 |
| <b>Перец</b>                             | Зеленая<br>гусеница,<br>паутинный<br>клещ, <i>Heliothis<br/>Spp.</i><br>(коробочковы<br>й червь) | 20 мл                                | Опрыскивать на этапе<br>откладывания яиц, до<br>момента вылупления<br>насекомых.                                                                                        | 2                                                                         | 7                                 |
| <b>Баклажан<br/>(открытый<br/>грунт)</b> | Зеленая<br>гусеница                                                                              | 14 - 28 мл                           | - Опрыскивать в начале<br>личиночной стадии, на<br>ранней стадии роста<br>растений.<br>- В случае сильного<br>заражения повторить<br>опрыскивание через 7 - 10<br>дней. | 2                                                                         | 7                                 |
| <b>Баклажан<br/>(теплица)</b>            | Совка                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                   |



|                                                           |                                                       |            |                                                                                                                                                                                                          |   |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <b>Капуста</b>                                            | Совка,<br>хлопковая<br>совка,<br>капустная<br>бабочка | 11 – 18 мл | - Опрыскивать в начале личиночной стадии, на ранней стадии роста растений.<br>- В случае сильного заражения повторить опрыскивание через 7 - 10 дней.                                                    | 2 | 3  |
| <b>Салат</b>                                              | Совка,<br>зеленая<br>гусеница                         | 18 – 25 мл | - Опрыскивать в начале личиночной стадии, на ранней стадии роста растений.<br>- В случае сильного заражения повторить опрыскивание через 7 - 10 дней.                                                    | 2 | 7  |
| <b>Хлопок<br/>(для<br/>производс<br/>тва<br/>волокна)</b> | Зеленая<br>гусеница                                   | 15 мл      | - Опрыскивать в начале личиночной стадии, на ранней стадии роста растений.<br>- В случае сильного заражения повторить опрыскивание через 7 - 10 дней.<br>- Семена хлопка не следует использовать в корм. | 2 | 21 |

### ВНИМАНИЕ:

- Используется только для вышеупомянутых культур и соблюдайте рекомендуемый безопасный период перед сбором урожая.
- Для контроля *Tuta absoluta* необходимо использовать чередование МЕТАВАП (максимум 2 процедуры / год) с пестицидами, не содержащими метафлумизон.

### СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством продуктов; перед смешиванием необходимо провести тест на совместимость.

### ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

24 часа с момента последнего опрыскивания.