

РАННАН-10%

РАННАН-10%

Класс:
Неоникотиноиды

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

Вододиспергируемый инсектицид приманка для сокращения популяций домашних мух (*Musca Domestica*) путем контактного и желудочного воздействия.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

ТИАМЕТОКСАМ
Z-9 ТРИКОЗЕН

10,0% (вес / вес) (активного вещества)
0,05% (вес / вес) (ПОЛОВОЙ АТТРАКТАНТ)

СВОЙСТВА:

РАННАН-10%: Высокоэффективный вододиспергируемый инсектицид приманка для сокращения популяции домашних мух (*Musca Domestica*).

РАННАН-10%: прост в использовании, подходит для нанесения краской или точечным опрыскиванием.

РАННАН-10%: Специальная комбинация неоникотиноидного инсектицида и аттрактанта является эффективной приманкой, благодаря которой мухи остаются на обработанных участках и потребляют контактную летальную дозу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

РАННАН-10% является составом, одинаково подходящим для нанесения краской или точечным напылением

Рекомендации по применению:

СПОСОБ ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА	
	100 г	400 г
ОКРАШИВАНИЕ	100 г / 80 мл воды = 40 м ² грунта или 80 - 120 м ² стена / потолочные поверхности	400 г / 320 мл воды = 160 м ² грунта или 320 - 480 м ² стена / потолочные поверхности
ТОЧЕЧНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ	100 г / 800 мл воды = 20 м ² земли или 40 - 60 м ² поверхность стены	400 г / 3,1 л воды = 80 м ² земли или 160 - 240 м ² поверхность стены

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не применять и не допускать сноса продукта к цветущим растениям или сорнякам, если пчелы находятся в зоне обработки.
- Не обрабатывать грязные, сильно пористые или недавно побеленные стены, чтобы предотвратить снижение эффективности препарата.
- Не наносить на металлические и стеклянные поверхности, чтобы избежать стекания.
- Применять только в местах, недоступных для детей, домашних животных, домашнего скота или дикой природе.
- Не наносить непосредственно на скот или корма для скота, так как это может привести к накоплению остатков препарата.
- Во время нанесения необходимо помешивать. Повторно повторить обработку, если распыление было прервано на 30 минут и более.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

До высыхания обработанной поверхности

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.