



SILEX -50% WDG СИЛЕКС-50% ФИНГИЦИД ВОДО-ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД, ОТНОСЯЩИЙСЯ К КЛАССУ СТРОБИЛУРИНОВ С МЕЗОСИСТЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОТИВ АСКОМИЦЕТОВ, ДЕЙТЕРОМИЦЕТОВ, БАЗИДИОМИЦЕТОВ И ООМИЦЕТОВ НА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

СОСТАВ:

КАЖДЫЙ 1 КГ СИЛЕКС -50% СОДЕРЖИТ:

**ТРИФЛОКСИСТРОБИН 50% (вес/вес)
(активного
вещества)**

КОМЕРЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

СИЛЕКС-50% :

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД, ОТНОСЯЩИЙСЯ К КЛАССУ СТРОБИЛУРИНОВ С МЕЗОСИСТЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОТИВ АСКОМИЦЕТОВ, ДЕЙТЕРОМИЦЕТОВ, БАЗИДИОМИЦЕТОВ И ООМИЦЕТОВ НА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	СРОК ОЖИДА НИЯ (ДНИ)	ВНИМАНИЕ
МИНДАЛЬ	АНТРАКНОЗ, ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, ПАРША ГНИЛЬ ЦВЕТКОВ	5.7 – 4.25 4.25 – 2.8	60	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 3 РАЗ ЗА СЕЗОН. - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА 7 - 14 ДНЕЙ
ЦИТРУСОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ (лимон, апельсин,) мандарин, паммело)	ГНИЛЬ ПАРША	2.8-5.7	7	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН
БАХЧЕВЫЕ (огурцы, кабачки, тыква, арбузы и мускусная дыня)	МУЧНИСТАЯ РОСА ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА	2.0 - 2.8 5.7	3	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН.

VAPCO

VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



ТОМАТЫ БАКЛАЖАНЫ ПЕРЕЦ	РАННЯЯ ГНИЛЬ СЕРЫЙ ПЯТНИСТОСТЬ, ФИТОФТОРОЗ АНТРАКНОЗ , СЕПТОРИОЗ МУЧНИСТАЯ РОСА (ПЕРЕЦ)	2.8 - 4.25 5.7 4.25 - 5.7 2.1 - 2.8	3	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН
КАРТОФЕЛЬ	РАННЯЯ ГНИЛЬ	4.25-5.7	7	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 6 РАЗ ЗА СЕЗОН .
ЯБЛОКИ, ГРУШИ, МУШМУЛА И АЙВЫ	ПАРША МУЧНИСТАЯ РОСА, РЖАВЧИНА НА ЯБЛОКАХ	ПРОФИЛАКТИКА, РАСПЫЛЕНИЕ(2.8) ОПРЫСКИВАНИЕ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ (3.5) 2.8 - 3.5	14	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН. - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ: ПАРША У ЯБЛОНЬ: 7 - 10 ДНЕЙ, МУЧНИСТАЯ РОСА: 10 - 14 ДНЕЙ.
АБРИКОС, ЧЕРЕШНЯ, НЕКТАРИНЫ, ПЕРСИКИ	ПАРША МУЧНИСТАЯ РОСА ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ	2.8 - 5.7	1	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 3 РАЗ ЗА СЕЗОН - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ : 7 - 14 ДНЕЙ
ВИНОГРАД	МУЧНИСТАЯ РОСА СЕРАЯ ПЛЕСЕНЬ И ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА	2.1 - 2.8 4.25 2.8 5.7	14	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН . - ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЕМ ДЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ, СЕРАЯ ПЛЕСЕНЬ И ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ: 14 - 21 ДНЕЙ, ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ :10 -14 ДНЕЙ, ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА: 7 - 10 ДНЕЙ. - НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВИНОГРАДА СОРТА CONCORD
СЕЛЬДЕРЕЙ	ГНИЛЬ РЖАВЧИНА	2.8 - 3.5	7	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН . - ИНТЕРВАЛ ДНЯ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЯМИ: 14 ДНЕЙ
МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА, РЕПА, ЦИКОРИЙ СВЕКЛА	ГНИЛЬ ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ МУЧНИСТАЯ РОСА РЖАВЧИНА	2.8 - 4.25	7	- НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН - ИНТЕРВАЛ ДНЯ МЕЖДУ ПРИМЕНЕНИЯМИ: 14 ДНЕЙ
КЛУБНИКА	МУЧНИСТАЯ РОСА	2.4	0	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 2 РАЗ ЗА СЕЗОН
ФИСТАШКИ	ГНИЛЬ ПОБЕГОВ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ	2.8 - 5.7 4.25 - 5.7	60	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 4 РАЗ ЗА СЕЗОН
СПАРЖА	ФИОЛЕТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ РЖАВЧИНА	4.2 - 5.6	180	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 3 РАЗ ЗА СЕЗОН.
РИС	ПИРИКУЛЯРИОЗ РИСА ВЗДУТИЕ ОБОЛОЧКИ	4.25-6.9	35	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 2 РАЗ ЗА СЕЗОН
ПШЕНИЦЫ	РЖАВЧИНА ПЯТНИСТОСТЬ МУЧНИСТАЯ РОСА	250 г /Га	49	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 2 РАЗ ЗА СЕЗОН
ЯЧМЕНЬ	РЖАВЧИНА ПЯТНИСТОСТЬ МУЧНИСТАЯ РОСА БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ	250 г /Га	49	НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ СИЛЕКС -50% БОЛЕЕ 2 РАЗ ЗА СЕЗОН



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ	МУЧНИСТАЯ РОСА ЛИСТОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ РЖАВЧИНА	2.5- 5.0	---	---
-----------------------	--	----------	-----	-----

ВНИМАНИЕ :

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ВЫШЕ УКАЗАННЫХ КУЛЬТУРАХ И ПОСЛЕ РЕКОМЕНДУЕМОГО БЕЗОПАСНОГО ПЕРИОДА ПЕРЕД СБОРОМ УРОЖАЯ.
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ВИНОГРАДЕ СОРТА **CONCORD** (УБЕДИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОВРЕЖДЕНИЙ НА РАСТЕНИЯХ).
- ДЛЯ КУЛЬТУР, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ ВЫШЕ; ОБРАБАТЫВАТЬ ПЛОЩАДЬ МОЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ.
- ДЛЯ КУЛЬТУР, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ ВЫШЕ, ОБРАБОТАННЫЙ РАЙОН МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ ОТ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТ ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ ОТ ПОСЛЕДНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.