

فا بكو

المجموعة:

سايلكس- 50%

مبيد فطري زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد فطري يجمع بين خواص المبيدات الجهازية و المبيدات التي تعمل بالملامسة (ميزوستيميك) ذو فعالية فائقة كمبيد وقائي ضد الفطريات البيضية، الأسكية، البازدية والناقصة على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل كغم يحتوى على :

تراي فلوكسي ستروبين 50% (و/و) (مادة فعالة)

الخواص:

سايلكس 50% : مبيد فطري يجمع بين خواص المبيدات الجهازية و المبيدات التي تعمل بالملامسة (ميزوستيميك) ذو فعالية فائقة كمبيد وقائي ضد الفطريات البيضية، الأسكية، البازدية والناقصة.

الاستعمالات:

- للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال 20 / لتر ماء	فترة الأمان (يوم)	ملاحظات
المشمش، الكرز، الدراق والخوخ	الجرب، البياض الدقيقي، تنقع الأوراق	2.8-5.7 غم	1	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد 7- 14 يوم من الرش الأولي.
التفاح، الاجاص، الاسكندنيا والسفرجل	الجرب صدا التفاح والبياض الدقيقي	2.8 غم (رش وقائي)، 3.5 غم (رش علاجي) 3.5-2.8 غم	14	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم ويعاد الرش للجرب و صدا التفاح بعد 7-10 أيام ، وللبياض الدقيقي بعد 10- 14 يوم. • عند رش المبيد أكثر من مرتين متتاليين ينصح باستخدام مبيد فطري آخر من مجموعه مختلفه ثم يعاد الرش من المبيد سايلكس 50%
الحمضيات (ليمون، برتقال، مندلينا ، بوملي)	اللفحات الجرب	2.8-5.7 غم	7	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم.

المحصول	الآفه	نسبة الاستعمال 20 / لتر ماء	فترة الأمان (يوم)	ملاحظات
العنب	البياض الدقيقي عفن البوترائيتس و التبقعات العفن الاسود البياض الزغبي	2.1 - 2.8 غم 4.25 غم 2.8 غم 5.7 غم	14	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم ويعاد الرش للبياض الدقيقي، عفن البوترائيتس و التبقعات بعد 14-21 يوم ، للعفن الأسود بعد 10-14 يوم وللبياض الزغبي بعد 7-10 أيام. • في حالات الاصابة الشديدة تستخدم نسبة الاستعمال الأعلى وفترة اعادة الرش الأدنى. • لا يستخدم على CONCORD GRAPES
القرعيات (خيار، كوسا، قرع، بطيخ والشمام)	البياض الدقيقي البياض الزغبي	2.0 - 2.8 غم 5.7 غم	3	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم
البندورة، الباذنجان والفلفل	اللفحة المبكره تبقع الأوراق الرمادي واللفحة المتاخره انثراكنوز والتبقع السبتوري بياض الدقيقي (على الفلفل)	2.8 - 4.25 غم 5.7 غم 4.25 - 5.7 غم 2.1 - 2.8 غم	3	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم
البطاطا	اللفحة المبكره	4.25-5.7 غم	7	• لا يرش المبيد أكثر من 6 مرات خلال الموسم

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال 20 / لتر ماء	فترة الأمان (يوم)	ملاحظات
الكرفس	اللفحات و الصدأ	2.8 - 4.25 غم	7	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد 14 يوم من الرشة الاولى.
اللفت، الجزر، الهندياء البرية، البقدونس والشمندر	اللفحات، تبقعات، بياض الدقيقي والصدأ	2.8 - 4.25 غم	7	• لا يرش المبيد أكثر من 4 مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد 14 يوم من الرشة الاولى. • في حالات الإصابة الشديدة تستخدم نسبة الاستعمال الأعلى وفترة اعادة الرش الأدنى.

تحذير:

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية الحصاد.
- يمنع استعمال المبيد على بعض أصناف العنب مثل CONCORD GRAPE لأنه يسبب حساسية لهذا الصنف.
- يسمح باعادة زراعة المحاصيل المذكوره في الجدول للمناطق المعاملة بالمبيد سايلكس 50% فوراً بعد الحصاد.
- وللمحاصيل الغير مذكوره في الجدول يتم زراعة الارض المعاملة بالمبيد سايلكس 50% بعد 30 يوم من اخر معاملة.
- يمنع استخدام المبيد في البيوت البلاستيكية وفي أنظمة الري.