

كرنشـر-51.4%

مبيد فطري زراعي سام
مركز معلق

مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى لمكافحة العديد من الامراض الفطرية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية (الخضراوات ، أشجار الفاكهة،... وغيرها من المحاصيل) .

التركيب : كل لتر يحتوى على :

29.6% (و/ح) (مادة فعالة)
21.8% (و/ح) (مادة فعالة)

ازوكسي ستروبيين
فلوتريافول

الخواص:

كرنشـر-51.4%: ذو تأثير مزدوج وفريد لمكافحة عدد كبير من الامراض الفطرية التي اكتسبت مناعة من المبيدات الاخرى.

كرنشـر-51.4%: مبيد فطري جهازى لمكافحة الامراض الفطرية (تبقع الاوراق ، الانثراكنوز، الاعفان، اللفحات، البياض الزغبي، البياض الدقيقي، الطخات، الصدأ)

الاستعمالات:

المحصول	المرض	معدل الاستعمال مل / 20 لتر ماء	ملاحظات الاستعمال	فترة الامان (يوم)
اللوز	تبقع الاوراق الالترناري، انثراكنوز، العفن البني، اللفحة ، اللفحة المتاخرة، الجرب، تتقب الاوراق	7 - 12	- العفن البني ولفحة الازهار: تتم المعاملة عند 15% من التزهير . - يتم الرش لاول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه - يعاد الرش بعد 7-21 يوم	21
البروكلي، الملفوف، الخردل، الزهره	التبقع الاسود، تبقع الاوراق ، البياض الدقيقي، الصدأ الابيض	7 - 12	- يتم الرش لاول مره عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه بشكل وقائي - يعاد الرش بعد 7 ايام	7
الذرة	الصدأ، انثراكنوز، تبقع الاوراق، لفة الاوراق	7 - 12	- يتم الرش عند بداية ظهور المرض ويعاد الرش كل 7-10 ايام - في حال الاصابة الشديدة يتم استخدام الجرعة الاعلى.	7
خيار، بطيخ، شمام، القرع، الكوسا	انثراكنوز، العفن، البياض الزغبي، لفة الساق، لفة الاوراق، تقرحات، البياض الدقيقي، تبقع الاوراق	7 - 12	- البياض الزغبي يتم المعاملة بشكل وقائي كل 5-7 ايام - العفن: تتم المعاملة الاولى بمرحلة 1-3 ورقات ويعاد الرش بعد 10-14 يوم - يتم الرش لاول مره عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه بشكل وقائي ويعاد الرش كل 7-	7

	14 يوم			
14	البياض الدقيقي: تبدأ المعاملة عندما تكون طول الاغصان 15-25 سم . - يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه ويعاد الرش 14 - 21 يوم	9 - 7	العفن الاسود، تبقع الاوراق، البياض الدقيقي، البياض الزغبي.	العنب
7	البياض الزغبي: يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة ويعاد الرش بعد 7 ايام. - يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه ويعاد الرش 7 - 14 يوم	12 - 9	تبقع الاوراق الالترناري، انثراكنوز، البياض الزغبي، اللفحة المتاخرة، اللفحة المبكرة، البياض الدقيقي، تبقع الاوراق، الصدأ	الخس، البقدونس، السبانخ
14	- العفن البني ولفحة الازهار: تتم المعاملة عند 1-5% من التزهير . - يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه - يعاد الرش بعد 7-21 يوم	12 - 8	تبقع الاوراق الالترناري، انثراكنوز، عفن الثمار، لفة الازهار، لفة الاوراق، صدأ الاوراق، البياض الدقيقي، الجرب.	الدراق، المشمش، النكتارين، الخوخ، الكرز
7	- يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه - يعاد الرش بعد 7 ايام	12 - 7	البياض الدقيقي، انثراكنوز، العفن	الفراولة
7	- يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الاصابة وقبل الاصابه - يعاد الرش بعد 7 - 21 يوم	12 - 6	انثراكنوز، البياض القبيقي، العفن الاسود، اللفحة المبكرة، اللفحة المتاخرة، التبقع السبتوري، التبقع	البندورة

			الزواوي	
7	- يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الإصابة وقبل الإصابة - يعاد الرش بعد 7 - 14 يوم	6 - 12	انثراكنوز، تبقع الاوراق ، البياض الدقيقي	الباذنجان، القلفل، الباميا
	- يتم الرش لأول مره بشكل وقائي عندما تصبح الظروف ملائمة لحدوث الإصابة وقبل الإصابة فترة الامان: 30 يوم للحبوب، 15 يوم للتبن، 7 ايام للاعلاف	6 - 10	الصدأ، البياض الدقيقي، تبقع الاوراق السببوري، اللطات	القمح

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الملصقة مع مراعاة فترات الأمان أثناء عملية القطف.
- يستخدم مرتين في السنة على محصول القمح، و 6 مرات في السنة على محصول العنب، و4 مرات في السنة على باقي المحاصيل المذكوره في جدول الاستعمال .
- ان بعض انواع التفاح حساس للمبيد كرنشر-51.4% لذلك يجب الاحتياط ويجب الا يستعمل عند وجود خطر انحراف الرش الى محصول التفاح المجاورة لانه قد يسبب حروق شديدة .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ويفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل البدء بعملية الرش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل المعامل قبل مرور 12 ساعة من المعاملة.