

فا بكو

المجموعة:
isoxazolidinone

كلومافاب-48%

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب

مبيد عشبي اختياري يستعمل قبل الانبات او قبل الزراعة لمكافحة الاعشاب الحولية رفيعة و عريضة الاوراق على المحاصيل الزراعية الواردة بالجدول.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

كلومازون 48% و/ح (مادة فعالة)

الخواص:

- كلومافاب-48% : مبيد عشبي اختياري يمتص عن طريق الجذور والاوراق وينتقل خلال النبات من داخل الى الخارج الاوراق
- كلومافاب-48% : يستعمل قبل الزراعة وقبل الانبات لمكافحة الاعشاب الحولية رفيعة وعريضة الاوراق.
- كلومافاب-48% : مبيد عشبي لمكافحة الاعشاب على المحاصيل التالية (الخيار، البطيخ، الشمام، القرع، الكوسا، الفول، الفاصولياء، البطاطا، التبغ)

الاستعمالات:

المحصول	الاعشاب	معدل الاستعمال (لتر / هكتار)	ملاحظات
الخيار، البطيخ، الشمام، القرع، الكوسا	عنب الديب، البقلة، ركب الجمل، المداد Apple Of Peru (Nicandra Potato Weed (Galinsoga Parviflora	1.0 – 0.5	- لا يستعمل في حال امكانية نقل اشتال الخيار. - قد يسبب حساسية لمحصول الشمام لذلك يتم استخدام الجرعة الاقل. - بعض انواع القرعيات قد تكون حساسة للمبيد كلومافاب-48%.
الفول، الفاصولياء		1.0 – 0.5	- يستعمل قبل انبات الاعشاب وبعد انبات المحصول. - يمكن خلط المبيد كلومافاب- 48% مع مبيدات اخرى لمكافحة الاعشاب قبل الانبات وبعد انبات المحصول.

- يستعمل بعد الزرع وقبل انبات الاعشاب لمكافحة الاعشاب العريضة. - معاملة الاشتال (يستعمل قبل نقل الاشتال) - قد يسبب حساسية لمحصول البطاطا عند استخدام المبيد بعد انبات المحصول	0.5	عنب الديب، البقلة، ركب الجمل، المداد Apple Of Peru (Nicandra Potato Weed (Galinsoga Parviflora	البطاطا
- يستخدم قبل نقل الاشتال او قبل نمو الاعشاب. - يتم استخدام الجرعة الاعلى في حال وجود كثافة للاعشاب.	2.0-1.0		التبغ قبل نقل الاشتال.

دونم=1000 م²

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمال.
- يتم تخفيف المبيد بكمية من الماء لا تقل عن 150-400 لتر/هكتار.
- يفضل عمل تجربة رش مصغره وذلك لان بعض المحاصيل حساسه للمبيد **كلومافاب-48%**

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

لا ينصح بدخول الحقل المرشوش قبل مرور 48 ساعة على اخر معاملة.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع مركبات ethofumesate ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة.