

ميتاستور- 39.1%

مبيد فطري زراعي سام معلق مستحلب

مبيد فطري يستخدم في بداية الزراعة عند مرحلة الاشتال لمكافحة طيف واسع من امراض التربة على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب : كل كغم يحتوى على :

28% (و/ح) (مادة فعالة)
10.9% (و/ح) (مادة فعالة)

ازوكسي ستروبين
ميتالاكسيل-م (ميفينوكسام)

الخواص:

- ميتاستور- 39.1% : مبيد فطري جهازى ذو تأثير علاجي للعديد من الامراض الفطرية.
- ميتاستور- 39.1% : خليط من المادتين (ازوكسي ستروبين و ميتالاكسيل-م (ميفينوكسام) لمكافحة فطريات التربة التي تصيب الخضروات والمحاصيل الحقلية.
- ميتاستور- 39.1% : يستخدم لمكافحة العديد من الامراض الفطرية (لفحة الشتلات، موت البادرات، وعفن الجذور على العديد من المحاصيل الزراعية الواردة ذكرها في جدول الاستعمال.

الاستعمالات:

المحصول في مرحلة الاشتال	المرض	معدل الاستعمال لكل 100 لتر ماء	تعليمات تطبيق المبيد قبل الزراعة وفترة الانتظار (يوم)
الخيار، الكوسا، الشمام، اليقطين، البطيخ	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	0
البندورة، الفلفل	عفن الجذور ، عفن الساق، لفحة الشتلات، موت البادرات	سقاية بمعدل 100-150 مل	0

المحصول في مرحلة الاشتال	المرض	معدل الاستعمال لكل 100 لتر ماء	تعليمات تطبيق المبيد قبل الزراعة وفترة الانتظار (يوم)
الملفوف، الخردل الاخضر، البروكلي	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	36
الشمندر، الفجل، البطاطا الحلوه، اللفت	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	0
الخس، البقدونس، السبانخ، السلق	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	36
البصل، الثوم، الكراث	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	0
الفول، العدس، البازيلاء، الفاصوليا، الحمص	لفحة الشتلات، موت البادرات، عفن الجذور	سقاية بمعدل 66 مل	0

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في الجدول اعلاه.
- ان بعض انواع التفاح حساس للمبيد لذلك يجب الا يستعمل عند وجود خطر انحراف الرش الى محصول تفاح مجاور. لانه قد يسبب حروق شديدة.