

АСОСНЕМ-25%

АКОХЕМ-25%

ИНСЕКТИЦИД

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
Неоникотиноиды

Системный инсектицид с трансламинарной активностью, обладает контактным и желудочным действием, легко усваивается растением.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ИМИДАКЛОПРИД

25% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АКОХЕМ-25%: используется в качестве системного инсектицида с контактным и желудочным действием.

АКОХЕМ-25%: контролирует широкий спектр вредных организмов, таких как тли, трипсы, белокрылки, минеры и моли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Огурцы, кабачки, арбузы, мускусная дыня, тыквы	Белокрылки, минеры, тли, трипсы, цикадки	4 - 8	7
Фасоль, салат, морковь, перец	Белокрылки, минеры, тли, трипсы, цикадки	8 - 20	7
Помидоры	Белокрылка	4 - 5	7
Картофель	Минеры	4 - 5	30
Баклажан	Тля	4 - 5	7
Полевые культуры, кукуруза, пшеница, ячмень	Тля	12 - 20	21
Яблоко, груша, айва, слива, персик, миндаль,	Минеры, тли, трипсы, цикадки	7 - 14	21

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

абрикосы, вишня, нектарин			
Лимон, апельсин, Паммел, мандарин, грейпфрут	Тля, трипсы, листоблошка, щитовки, мучнистый червец	15 - 20 г/ 5 л воды / дерево	10
Пальма	Щитовки	15 - 20 г/ 5 л воды / дерево	После сбора урожая
Декоративные растения	Белокрылки, тли, трипсы	12 - 20	---

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений, таких как Бордо смесь. Использовать продукт сразу после смешивания.

- **Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.**