

AGRINATE-24%

АГРИНАТ-24%

ИНСЕКТИЦИД

РАСТВОРИМОЙ КОНЦЕНТРАТ

Класс:
КАРБАМАТЫ

Системный инсектицид используется для контроля широкого спектра сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

МЕТОМИЛ

24% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АГРИНАТ-24%: оказывает быстрое воздействие на насекомых.

АГРИНАТ-24%: высокоэффективен против широкого спектра насекомых на всех стадиях развития (яйца, личинки, имаго).

АГРИНАТ-24%: чрезвычайно активен в отношении сложных насекомых-вредителей, таких как сверлильщик, фруктовая гусеница, минер, которые стали устойчивыми к фосфорорганическим и пиретроидным соединениям.

АГРИНАТ-24%: быстро разлагается в природе, что сокращает безопасный период для овощей и фруктовых деревьев.

АГРИНАТ-24%: не устойчив в окружающей среде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Плодовые черви, листовые черви.	11-15	7
Капуста. Цветная капуста	Зеленые черви, листовые черви, тля, трипсы.	11-15	7
Огурцы, кабачки, арбузы, фасоль, еврейская мальва, перец, баклажаны, картофель.	Листовые черви, тля, трипсы.	15	7
Кукуруза	Гусеница озимой совка, кукурузный мотылек, тля, жуки.	15	7

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Яблоки, груша, персик, абрикос, вишня, миндаль и цитрусовые	Зеленая и черная тля, минеры, огневка, листоблошка, листовертки, трипсы, цикадки.	10-15	7
Виноград	Листовертка виноградная, цикадки.	11-15	7
Хлопок	Хлопковый листовой червь, совка, жуки, тля, трипсы, цикадки.	15	-
Декоративные растения (открытое поле, теплицы)	Листовертки, минеры, жуки, листовые черви, цикадки, тля, трипсы.	11-15	-

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

72 часа после последнего применения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Использовать опрыскиватели с низким объемным давлением для больших ферм, не подходит для использования в садах.
- Заполнить 1/4 или 1/2 емкости для опрыскивания водой, затем добавить рекомендуемую дозу **АРГИНАТ-24%**, перемешать, заполнить емкость и начать опрыскивание.
- Использовать рекомендуемое количество в начале заражения, повторить распыление с интервалами в 5-7 дней.
- Если рекомендуется более одной дозы, использовать более низкую дозу для молодых культур или если наблюдаются незначительные травмы.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.