

AGRINATE-25%

АГРИНАТ-25%

Класс :
КАРБАМАТЫ

ИНСЕКТИЦИДЫ СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Системный инсектицид используется для контроля широкого спектра сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

МЕТОМИЛ

25% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АГРИНАТ-25%: оказывает быстрое воздействие на насекомых.

АГРИНАТ-25%: высокоэффективен против широкого спектра насекомых на всех стадиях развития (яйца, личинки, имаго).

АГРИНАТ-25%: чрезвычайно активен в отношении сложных насекомых-вредителей, таких как сверлильщик, фруктовая гусеница, минер, которые стали устойчивыми к фосфорорганическим и пиретроидным соединениям.

АГРИНАТ-25%: быстро разлагается в природе, что сокращает безопасный период для овощей и фруктовых деревьев.

АГРИНАТ-25%: не устойчив в окружающей среде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Плодовые черви, листовые черви.	1 - 2 мешка/бак 18 - 36 г / 20 л воды	7
Капуста, Цветная капуста	Зеленые черви, листовые черви, тля, трипсы.	1 - 2 мешка/бак 18 - 36 г / 20 л воды	7
Огурцы, кабачки, арбузы, фасоль, еврейская мальва, перец, баклажаны, картофель.	Листовые черви, тля, трипсы.	2 мешка/бак 36 г / 20 л воды	7
Кукуруза	Гусеница озимой совки, совка, кукурузный мотылек, тля и жуки.	2 мешка/бак 36 г / 20 л воды	7
Яблоки, груша, персик, абрикос,	Зеленая и черная тля, минеры, огневка, листоблошка,	2 мешка/бак 36 г / 20 л воды	14

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

вишня, миндаль и цитрусовые	листовертки, трипсы, цикадки.		
Виноград	Листовертка виноградная, цикадки.	2 мешка/бак 36 г /20 л воды	7
Декоративные растения (открытое поле, теплицы)	Листовертки, минеры, жуки, листовые черви, цикадки, тля, трипсы.	2 мешка/бак 36 г /20 л воды	-----

Мешок = 200 г **АРГИНАТ -25%**

Бак = 200 л воды

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

72 часа после последнего применения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Использовать опрыскиватели с низким объемным давлением для больших ферм, не подходит для использования в садах.
- Заполнить 1/4 или 1/2 емкости с распылителем водой, затем добавить рекомендуемую дозу **АРГИНАТ -25%**, размешать, наполнить бак и начать распыление.
- Использовать рекомендуемое количество в начале заражения, повторное опрыскивание проводить с интервалом в 5 - 7 дней.
- Если рекомендуется более одной дозы, использовать более низкую дозу для молодых культур или если наблюдаются незначительные травмы.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов. Перед применением следует провести пробное смешивание.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.