

АМЕТРАВОЛЕ-80%

АМЕТРАБОЛ-80%

Класс:
1,3,5-триазин

ГЕРБИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Избирательный системный гербицид, используется до и после периода прорастания, контролирует большую часть однолетних и широколистных сорняков; быстро поглощается побегами и корнями прорастающих сорняков.

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит:

АМЕТРИН

80% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АМЕТРАБОЛ-80%: Избирательный системный гербицид, используемый до и после появления всходов, предназначен для борьбы с однолетними и широколиственными сорняками в сахарном тростнике, бананах и кукурузе.

АМЕТРАБОЛ-80%: Совместим с большинством других пестицидов и удобрений при соблюдении указанной нормы расхода.

АМЕТРАБОЛ-80%: убивает сорняк после проникания в корневую систему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ
Сахарный тростник	3 кг / Га + 500 мл (Распространение гербицида) Смесь: 2 кг / Га АМЕТРАБОЛ-80% + 2,5 л 2,4-D Амина	- Для контроля однолетних и широколиственных сорняков, наносят на поверхность почвы в качестве предварительной или ранней послевсходовой обработки. - Интегрированный контроль против чумизы (Cyperus esculentus) и поздний контроль должны проводиться до цветения.
Цитрусовые	2 кг/ Га	Применяют в качестве спрея в весенний сезон. Вторую обработку проводят через 60 - 90 дней.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Бананы	2 кг / Га	Применять в качестве прямого спрея после завязывания плодов; повторить с интервалом в 3-4 месяца.
Кукуруза	2.5 – 3 кг/ Га	Применяют в качестве прямого распыления, когда кукуруза достигает высоты 18 см, и никогда не использовали раньше 6 недель после посадки.

Гектар = 10000 м²

ВНИМАНИЕ: Использовать только на выше перечисленных культурах.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Может быть использован в несельскохозяйственных землях для контроля большинства однолетних и широколиственных сорняков.
- Для достижения наилучших результатов применять АМЕТРАБОЛ-80% после всхода сорняков, когда растение достигает в высоте 5 см или в фазу 3 истинных листа.
- При использовании АМЕТРАБОЛ-80% после появления всходов предпочтительно добавлять в раствор добавочный агент 0,1-0,3%, способствующий легкому поглощению раствора листьями.
- АМЕТРАБОЛ-80% можно использовать при предварительной обработке; почва должна быть влажной, чтобы легко перемещать пестицид в корневой зоне сорняков.
- Использовать 250-400 литров воды / Га при применении обратного опрыскивателя или тракторного опрыскивателя и использовать высокую дозировку для распыления сорняков при тяжелом заражении.
- Для обеспечения хорошего покрытия гербицидом поверхности почвы при распылении необходимо использовать специальные форсунки.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:

Не пасти или не кормить животных на поле, на котором недавно использовали пестициды.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других пестицидов и удобрений при соблюдении указанных норм расхода.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.