

BEATHRIN-2.5% БЕЛАТРИН-2.5%

Класс:
Пиретроиды

ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Несистемный пиретроидный инсектицид с контактным и желудочным действием. Оказывает быстрое возжействие на нервную систему насекомых, обладает длительной остаточной активностью. Используется для борьбы с сосущими насекомыми на широком спектре сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

**2,5% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

БЕЛАТРИН-2,5%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактным и желудочным действием. Действует на нервную систему насекомых.

БЕЛАТРИН-2,5%: дает быстрый эффект и обладает хорошей остаточной активностью.

БЕЛАТРИН-2,5%: используется для борьбы с широким спектром насекомых, таких как: листовой червь, фруктовый червь, огневка и сосущие насекомые.

БЕЛАТРИН-2,5%: токсичен для рыб и пчел.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Фасоль, капуста, цветная капуста, перец, чеснок, помидор, салат, лук, картофель, арбуз,	Чесночная моль, Американская хлопковая совка, капустная масляная муха, хлопковая листовая гусеница.	10-12	7

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

огурец.			
Нут	Гусеница почек и бутонов	4 – 8	14
Яблоко, персик, нектарин, слива, миндаль, вишня	Листовая, фруктовая и бутонная моли, минеры , грушевая листоблошка	10	7
Авокадо	Фруктовый пятнистый клоп	5 – 10	7
Хлопок	Американская хлопковая совка, алмазная совка, клоп красильщик, тля, белокрылка, листовая гусеница, <i>Lygus Spp.</i> (клоп травяной)	15	---
КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Люцерна	Красноногий наземный клещ, Синий овсяный клещ	4	---
Люпин	Гусеница озимой совки, местная совка	4 – 8	14
	Красноногий наземный клещ, Синий овсяный клещ	4	
Кукуруза	Американская хлопковая совка, хлопковая листовая гусеница, мотылек кукурузный.	10-20	14
Сорго	Галлица сорговая	6	14
	Местная совка	12	
Злаки	Гусеница озимой совки	6-12	7
Рапс	Красноногий наземный клещ, Синий овсяный клещ	4	14
	Листовертки	4 – 8	
Масло чайного дерева	Жук Пирго, листоблошки чайного дерева	4 – 8	12 недель
Макадамия	Ореховый точильщик	10	7
	Фруктовый пятнистый клоп	5 – 10	
Кофе	Минеры	10	---
Декоративные растения	Гусеницы, африканская совка, бутонная муха	16	---

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.