

VENOMYL-50%

БЕНОМИЛ-50%

Класс:
Бензимидазолы

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Системный фунгицид эффективен против широкого спектра грибковых заболеваний, которые влияют на сельскохозяйственные культуры.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

БЕНОМИЛ

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

БЕНОМИЛ-50%: системный фунгицид для борьбы с грибковыми заболеваниями сельскохозяйственных и садовых культур и оказывает вторичное воздействие на паутинных клещей.

БЕНОМИЛ-50%: Высокая эффективность при низкой концентрации.

БЕНОМИЛ-50%: Безопасен для пчел.

БЕНОМИЛ-50%: Способствует сохранению продуктов после сбора урожая и во время хранения без какого-либо побочного эффекта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Яблоки, груши, айва. Миндаль, абрикос.	Мучнистая роса, парша, Бурая гниль, коккомикоз, монилиоз, акароз	12	Начинать опрыскивание при появлении первых симптомов заболевания, повторно обрабатывать в течение 10-14 дней.	14
				3
Виноград	Мучнистая роса	12	Перед цветением давать на 10-14 дней.	7
Картофель	Мучнистая роса	8	Начинать распыление при появлении первых симптомов заболевания, повторить опрыскивание каждые 10-14 дней, если необходимо.	14
Пимидоры	Мягкая гниль, Листовая гниль, Белая гниль, пятнистость листьев .	5 - 6		3

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

Кабачки, огурцы, арбузы, мускусная дыня	Антракноз, ложная мучнистая роса, пятнистость листьев.	12	Начинать опрыскивание при появлении первых симптомов заболевания, повторно обрабатывать в течение 10-14 дней.	3
Клубника	Мучнистая роса , пятнистость листьев вялость, корневая гниль	20	Начните опрыскивание, когда появляются первые симптомы заболевания, повторно применять каждые две недели. Обрабатывают в течение 25 минут раствором БЕНОМИЛ- 50% .	3
Бананы	Банановая гниль	16	Обрабатывать после сбора урожая, окуная бананы в раствор БЕНОМИЛ 50% в течение 10 минут, затем высушить.	--
Фасоль	Мучнистая роса	12	Начинать опрыскивание при появлении первых симптомов заболевания, повторно обрабатывать в течение 10-14 дней.	14
Горох	Склеротиниоз	20	Опрыскивать растения при 1% цветения. Повторно обрабатывать в течение 10-14 дней Расход смеси равен 500- 1000 литров на гектар, для обеспечения полного смачивания растений.	21
Подсолнух	Склеротиниоз	200 г на 100 кг семян	Обработка семян: Замочить 1 литр чистой воды на рекомендуемое количество семян. Добавить рекомендуемое количество БЕНОМИЛ- 50% к влажным семенам. Объем воды может быть слегка изменен для обеспечения достаточного смачивания семян. Лечение будет	---

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

			контролировать только склеротинию семени. Тщательно перемешайте семена и продукт; раствор должен полностью покрывать семена.	
Лесной орех	<i>Cercospora</i> и <i>Phoma</i> пятнистость листьев	6	Программа опрыскивания: Опрыскивать при первых признаках заболевания на более старых листьях или не позднее первой недели января для арахиса, выращенного в условиях сухих земель или при наводнении. Для арахиса, находящегося в условиях ирригации, распыление должно начинаться не позднее середины декабря. Повторно обрабатывать в течение 10-14 дней. Для арахиса, находящегося в условиях засушливых земель, рекомендуется использовать 4 - 5 опрыскиваний, а в условиях ирригации опрыскивают 6 – 7 раз. Если для сена необходимо использовать листву арахиса, опрыскивать за 14 дней до даты сбора урожая.	42
Розы и декоративные деревья	Мучнистая роса , Парша, пятнистость листьев, серая плесень.	12	Повторное распыление проводить каждые 10-14 дней, если необходимо.	---

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ВНИМАНИЕ:

Используется только на вышеупомянутых культурах; при использовании необходимо соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Смешать БЕНОМИЛ-50% с приклеивающимся материалом (например, SUPER SURFIX), чтобы обеспечить равномерное распределение на растениях, таких как розы.

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Через 24 часа после последней обработки.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов.

ВНИМАНИЕ:

Влажность может вызвать химические изменения БЕНОМИЛ-50%, поэтому контейнер следует плотно закрывать и хранить вдали от влаги.

*** ДРУГИЕ ТОРГОВЫЕ НАЗВАНИЯ: BENOVAR-50% WP, AGRONYL - 50% WP.**

- **Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**