

ВІFЕНАМІN-10% БИФЕНАМИН-10%

Класс:
Пиретроиды

ИНСЕКТИЦИД / АКАРИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Пиретроидный инсектоакарицид, обладает контактным и остаточным эффектом. Используют при защитной обработке или для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Наилучшие результаты достигаются при применении БИФЕНАМИНА до того, как популяции вредных организмов достигнут разрушающих уровней.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

БИФЕНТРИН 10% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

БИФЕНАМИН-10%: пиретроидный инсектоакарицид, который действует на нервную систему насекомых.

БИФЕНАМИН-10%: Эффективен против широкого спектра насекомых на сельскохозяйственных культурах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДА	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)	ЗАМЕЧАНИЕ
Конские бобы, клевер, ячмень, полевой горох, люцерна и пшеница	Красноногий наземный клещ, бурая пастбищная пяденица, пастбищный мотылек	1 - 4	4 недели	---
Хлопок	Белокрылка, местная совка, хлопковая совка, двупятнистый паутинный клещ,	12 - 16	21	Не обрабатывать личинки хлопковой совки длиной больше 5 мм.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	яблочный рябой клоп			* Норма расхода основана на расстоянии между рядами = 1 м; если расстояние между рядами больше 1 м, применять препарат с нормой расхода мл / 100 м ряда
	Ложный проволочник, тростниковый проволочник	375 мл /Га* или 4 мл / 100 м на ряд		
Рапс	Овощной долгоносик	20 - 40	---	---
Сахарный тростник	Тростниковый проволочник	375 мл/Га* или 5.6 мл/ 100 м на ряд	---	* Норма расхода основана на расстоянии между рядами =1,5 м; если расстояние между рядами больше 1,5 м, применять препарат с нормой расхода мл / 100 м ряда
КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)	ЗАМЕЧАНИЕ
Кукуруза	Кукурузный мотылек, травяной клещ	8 - 20	14	---
Помидоры	Местная совка, гусеница совки хлопковой американской, двупятнистый паутинный клещ	Низкий объем 8 - 12 или Большой объем 600 мл/Га	1	Не использовать низкий объем земли или применять воздух на шпалерных помидорах. Не обрабатывать личинки хлопковой совки длиной больше 5 мм.
	Белокрылка	6		
Картофель	Колорадский картофельный жук, зеленая персиковая тля, картофельная цикадка	4 - 20	---	---
Овощи	Капустная пяденца, капустная совка, моль капустная, зеленая персиковая тля, капустная тля, белокрылка сладкого картофеля, двупятнистый паутинный клещ	5 - 12	1	Провести одну обработку до цветения. Добавить неионогенное поверхностно-активное вещество.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Стекланная оранжерея (овощи и декоративные растения)	Тепличная белокрылка, листовертка, двупятнистый паутинный клещ	4 - 8	3	---
Клубника	Двупятнистый паутинный клещ	8 - 20	1	---
Персики, нектарины, сливы, абрикосы, миндаль, вишня	Жук-карпофил	10	1	Интервал не менее 10 дней между повторной обработкой и первоначальным применением.
Яблони и груши	Длиннохвостый мучнистый червец	5 мл + SAMAROL (1л/100 л)	14	Не распылять, пока весной не появится большое количество молодых нимф.
	Фруктовая листовертка, яблоневый минер, яблоневая личинка, белые яблочные цикадки, яблоневая тля, грушевая листоблошка, двупятнистый паутинный клещ, паутинный клещ	2 - 4 для борьбы с насекомыми. 4 - 8 для борьбы с насекомыми и клещами.		При большом количестве клещей может потребоваться большая норма расхода (30-60 мл / гл), особенно при высоких температурах. Не распылять после начала цветения.
Бананы	Клубничный паутинный клещ	8 (использовать общий объем опрыскивания 300-500 л / Га)	8	Применять БИФЕНАМИН в качестве профилактического, а не лечебного средства (до того, как произойдет повреждение, и до того, как количество клещей достигнет разрушительного уровня). Последующие обработки можно проводить с интервалом от 10 до 14 дней. Банановый долгоносик:
	Банановый долгоносик, Точильщик, трипсы (вызывающие ржавчину)	Сезонная программа: дважды в год 50 - 66 или Один раз в год 132		

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

				обработку следует проводить после дождя или полива в периоды высокой активности взрослого бурильщика. Банановая трипса: Применение должно быть сделано, когда активность трипсы увеличивается.
Лимон, апельсин, паммело, мандарин, грейпфрут	Листовой долгоносик	Предвсходовая программа 12,5 - 25 мл / дерево Послевсходовая программа мониторинга 6 мл / дерево	---	Предвсходовая программа: Применять непосредственно перед или при первых признаках появления крупного жука в середине октября. Послевсходовая программа: Применять на пике появления жуков в октябре / ноябре. Может потребоваться последующая обработка, если найдется 25 жуков на 10 участков сада, с интервалом 1-2 недели.
Виноград	Фиговый ткач-усач	200	---	---
Декоративные растения	Тля, мешочницы, гусеница озимой совки, вязовый листоед, паутинные гусеницы, клопы-кружевницы, гусеницы (поедающие листья), растительные клопы (в том числе травяной клоп), коконопряды	6-11	---	---
	Свекольная совка, долгоносик бахчевой (имаго), ложнощитовка	11-23		

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	мягкая, широкие клещи, листовертки, сороконожки, цитрусовые клещи, клеверные клещи, сверчок, тростниковый долгоносик (имаго), уховертка, европейский красный клещ, блохи, грибные мошки (имаго), кузнечики , непарный шелкопряд, гусеницы, цикадки, листовертки, мучнистые клопы, клещи многоножки, орхидейный долгоносик, мокрицы, ракообразные клопы, паутинные клещи, белокрылки			
	Муравьи, японский жук (имаго), минеры, клещик гикори, садовник (имаго)	23-46		

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов с момента последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.