

САРТАР-50%

КАРТАП-50%

ИНСЕКТИЦИД

РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК

Класс:
2-диметиламинопропан
-1.3- дитиол

Системный инсектицид используется против жевательных и сосущих насекомых на многих сельскохозяйственных культурах.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

КАРТАП

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

КАРТАП-50%: Системный инсектицид с контактным и желудочным действием.

КАРТАП-50%: Используется против жевательных и сосущих насекомых на всех стадиях их развития.

КАРТАП-50%: Умеренно токсичен для млекопитающих, токсичен для рыб и низко токсичен для пчел.

КАРТАП-50%: Не накапливается в тканях животных.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г /20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Капуста	Моль капустная	25	14
Салат	Гусеница озимой совки, тля	19 - 37.5	10
Тыква	Трипсы, тля, листовые черви, блошки, жук-коровка северная	19 - 25	10
Картофель	Картофельная клубневая моль	25	7
Брокколи	Тля, гусеница озимой совки	25	7
Шпинат	Трипсы	25	7
Чеснок	Трипсы, гусеница озимой совки	19 - 25	10
Лук	Трипсы, гусеница озимой	19 - 25	10

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	совки		
Горох	Минеры	25 – 50	1
Кукуруза	Кукурузный мотылек	20	21
Манго	Цикадки, сучкорез, вершинорез	19 - 25	10
Рис	Личинка мутовки, рисовая огневка, зеленая цикадка, бурая травяная цикадка	37.5 - 62.5	10
Декоративные растения	Трипсы	25	5

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: VARTAP – 50% SP.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.