

CHLOROFET - 48%

Класс:
Органофосфаты

ХЛОРОФЕТ-48%

ИНСЕКТИЦИД

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Несистемный фосфорорганический инсектицид с контактным, желудочным и дыхательным действием, используемый для борьбы с вредными насекомыми, поражающими картофель, морковь, цитрусовые и фруктовые деревья.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ХЛОРПИРИФОС

**48% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ХЛОРОФЕТ-48%: инсектицид, предназначенный для борьбы с вредными насекомыми, поражающие сельскохозяйственные посевы, включая цитрусовые, семечковые, косточковые и оливковые деревья.

ХЛОРОФЕТ-48%: несистемный инсектицид, который оказывает контактное, желудочное и дыхательное действие.

ХЛОРОФЕТ-48%: используют для борьбы с почвенными насекомыми.

ХЛОРОФЕТ-48%: не фитотоксичен для большинства видов растений при использовании в соответствии с рекомендациями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Виноград	Щитовки, джассиды, бутонные черви	14	21
Цитрусовые	Красные щитовки, мучнистые червецы, щитовка черная, ложнощитовка полушаровидная, моль цитрусовая цветочная, белокрылка, трипсы.	21 - 25 опрыскивание в течение июня-сентября до заражения плода. Опрыскивать 3 раза в течение сезона.	21
Яблоко, груша, абрикос,	Тля, фруктовый червь, прокалывающее лист насекомое, щитовка оливковая, паутинный	17 - 25	14

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

персик, слива, оливки.	клещ, плодоярка, галловая тля.		
Помидоры, баклажаны, перец	Плодовый червь, гусеница озимой совки, листовые черви, тля, белокрылка, трипсы.	40 - 50 Проводить опрыскивание, когда появляются черви или яйца. Повторять опрыскивание каждые 2 недели	14 7
Тыквенные	Гусеница озимой совки, листовые черви, тля, белокрылка, трипсы.	40 - 50 Проводить опрыскивание, когда появляются черви или яйца. Повторять опрыскивание каждые 2 недели	14 7
Картофель, морковь.	Гусеница озимой совки, листовые черви, тля, белокрылка, трипсы.	33 - 42 Проводить опрыскивание, когда появляются черви или яйца. Повторять опрыскивание каждые 2 недели	21
Пшеница	Тля	4.6 - 7.6	7
Рис	Точильщики Цикадки	18 - 24.2 21 - 25	7
Лук-порей	Личинка луковой мухи	60 - 87	7

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, кроме щелочных соединений.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

CHLOROFET- 48% WP, CHLOROFET - 50% EC, CHLOROFET - 55% EC, CHLOROTHRIN - 55% EC (CHLORPYRIFOS 50% + CYPERMETHRIN 5%).

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.