СЛОМАВАР-48%

КЛОМАВАП-48%

Класс:
Исоксазолидионы

ГЕРБИЦИД

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Системный довсходовый и предпосевной гербицид, предназначен для борьбы с травами и однолетними широколистными сорняками в огурцах, арбузах, дыне, тыкве, тыкве, бобах, фасоли, картофеле, табаке.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

КЛОМАЗОН

**48% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

КЛОМАВАП-48%: селективный гербицид, поглощаемый корнями и побегами;

КЛОМАВАП-48%: применяется до появления всходов или перед посевом культур для борьбы с травами и однолетними широколистными сорняками;

КЛОМАВАП-48%: используется для борьбы с сорняками на широком спектре сельскохозяйственных культур (огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачки, бобы, фасоль, картофель, табак).

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НОРМЫ РАСХОДА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯКИ	НОРМА РАСХОДА (л/Га)	CRITICAL COMMENTS
Огурцы, арбузы, дыни, тыквы, кабачок.	Обыкновенный дурман (никандра физалисовая/ <i>nicandra physalodes</i>), паслен ежевики (черный паслён/ <i>solanum nigrum</i>), марь белая (<i>chenopodium album</i>), лебеда белая(портулак огородный/ <i>portulaca oleracea</i>), галинсога мелкоцветная (<i>galinsoga parviflora</i>), амарант (щирлица/ <i>amaranthus powellii</i>)	0.5 -1 л/Га	- не обрабатывать почву, предназначенную для пересадки тыквенной рассады. - Арбузы чувствительны к КЛОМАВАП - 48%. Следует использовать только минимально рекомендуемую дозу. - применять предпосевную обработку до появления сорняков. Некоторые сорта тыквенных могут показать различные уровни толерантности к КЛОМАВАП-48%
Фасоль, бобы	Обыкновенный дурман (никандра физалисовая/ <i>nicandra physalodes</i>), паслен ежевики (черный паслён/ <i>solanum nigrum</i>), марь белая (<i>chenopodium album</i>), лебеда белая(портулак огородный/ <i>portulaca oleracea</i>), галинсога мелкоцветная (<i>galinsoga parviflora</i>), амарант (щирлица/ <i>amaranthus powellii</i>)	0.5 -1 л/Га	Проводить довсходовую обработку, до появления сорняков. КЛОМАВАП-48% можно использовать в баковой смеси с другими послевсходовыми гербицидами. Использовать более низкие нормы в комбинации с другими послевсходовыми гербицидами до появления растений, чтобы расширить спектр обрабатываемых сорняков.
Картофель	Обыкновенный дурман (никандра физалисовая/ <i>nicandra physalodes</i>), паслен ежевики (черный паслён/ <i>solanum nigrum</i>), марь белая (<i>chenopodium album</i>), лебеда белая(портулак огородный/ <i>portulaca oleracea</i>), галинсога мелкоцветная (<i>galinsoga parviflora</i>), амарант (щирлица/ <i>amaranthus powellii</i>)	0.5 л /Га	применять КЛОМАВАП-48% в баковых смесях с другими послевсходовыми гербицидами до появления всходов для расширения спектра сорняков.

- **Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.**

<p>Табак (только пересаженные и табак. Не использовать на грядках с рассадой).</p>	<p>Обыкновенный дурман (никандра физалисовая / <i>nicandra physalodes</i>), паслен ежевики (черный паслен / <i>solanum nigrum</i>), марь белая (<i>chenopodium album</i>), лебеда белая (портулак огородный / <i>portulaca oleracea</i>), галинсога мелкоцветная (<i>galinsoga parviflora</i>), амарант (щирца / <i>amaranthus powellii</i>)</p>	<p>1 - 2 л/Га</p>	<p>применять перед пересадкой, если сорняки появились до того, как их можно было обработать, возделывать незадолго до или во время обработки, или если до посадки использовать в баковой смеси с гербицидом, сбивающим с ног. использовать более высокие дозы, когда много сорняков или в более тяжелых типах почв. использовать более низкие дозы на песчаных почвах с низким содержанием органических веществ.</p>
---	--	-------------------	--

ЗАМЕЧАНИЕ:

- используется только на вышеупомянутых культурах.
- Наносить на сухой грунт 150-400 л / Га.
- Перед обработкой следует провести тест на небольшом участке, прежде чем применять их в более широком масштабе.

СОВМЕСТИМОСТЬ: несовместим с Этофумесатом, перед смешиванием желательно сделать тест на совместимость.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: Не использовать обработанное поле до 48 часов после применения.

- **Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.**