

СУМОДОН- 52.5%

ЦИМОДОН-52.5%

ФУНГИЦИД

ВОДОДИСПЕРГИРУЕМЫЕ ГРАНУЛЫ

Класс:
Цианоацетамид оксим
Оксазолидиндоны

Является системным, контактным и антиспорулентным фунгицидом для борьбы с грибковыми заболеваниями на сельхозкультурах, перечисленных в таблице применения.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

ЦИМОКСАНИЛ	30,0 % вес / вес (активного вещества)
ФАМОКСАДОН	22,5 % вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ЦИМОДОН- 52,5%: системный и контактный фунгицид, используемый для борьбы со многими грибковыми заболеваниями на культурах, перечисленных в таблице применения.

ЦИМОЛОН- 52,5%: содержит два активных вещества, Фамоксадон и Цимоксанил.

ЦИМОДОН- 52,5%: Фамоксадон ингибирует митохондриальный перенос электронов и прорастание спор, в то время как Цимоксанил – воздействует на плесень, оказывая противовоспалительное действие.

ПРИМЕНЕНИЕ И НОРМЫ РАСХОДА:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г/20 л ВОДЫ	МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБРАБОТОК	ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Картофель	Ранняя гниль, фитофтороз	8	4	Предпосевная до сбора урожая	14 дней
Помидоры	Ложная мучнистая роса,	8	4	Предпосевная до сбора урожая	3 дней
Салат					
Огурцы, кабачки, арбузы,	Альтернариоз , серая				

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

тыква, мускусная дыня	пятнистость листьев				
Виноград	Ложная мучнистая роса	8	6	На стадии 5-6 листов до 1 месяца пока не собирайте урожай	21 дней

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности перед сбором урожая.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим со многими широко используемыми фунгицидами и инсектицидами, но перед смещиванием необходимо проводить тест на совместимость.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

24 часа с момента последнего распыления.

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.