

DELTA[®] RIN-2.5%

ДЕЛЬТАРИН-2.5%

ИНСЕКТИЦИД

Класс:
Перитроиды

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Один из самых сильных инсектицидов в пиретроидной группе, которые контролируют широкий спектр насекомых-вредителей.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ДЕЛЬТАМЕТРИН

2,5% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: несистемный пиретроидный инсектицид с контактом и желудочным действием.

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: оказывает быстрое действие против широкого спектра насекомых-вредителей.

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: один из самых сильных инсектицидов в пиретроидной группе.

ДЕЛЬТАРИН - 2,5%: не подвержен воздействию света или температуры, обладает длительным периодом активности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫ Й ПЕРИОД (ДНИ)
Помидор, перец, огурец (пластиковы е теплицы)	Белая муха, томатный плодовой червь, минеры, трипсы, тля, личинки чешуекрылых.	10 - 15	3
Капуста, Цветная капуста	Капустный листовой червь, личинки чешуекрылых.	10 - 12	7
Картофель	Листовертки, тля, трипсы, личинки колорадского жука, картофельная клубневая моль	10 - 15	3
Лук	Луковая муха, трипсы, минеры	10 - 15	7
Яблоки, груши,	Гусеницы, листоблошки, минеры, плодожорки, грушевая	10 - 15	7

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

персик, абрикос	листоблошка, плодовая мушка		
Манго	Цикадки, сучкорез и вершинорез	10 - 12.5	7 - 10 (не распылять через 29-35 дней после распускания почек)
Банан	Цветочные трипсы, Тля	12.5	7 - 10
Бобовые (фасоль, соя и т.д.)	Бобовая муха, блошки, клопы, трипсы, гусеница озимой совки, совка	10 - 12.5	При предварительном цветении насекомым достаточно 7 - 10 дней
	Стрючковый точильщик, гусеница озимой совки, совки, полупяденица, бобовый ликаенид	12.5	После периода цветения насекомых обрабатывать 12,5 мл / 20 л воды через 30, 40 и 50 дней.
Кукуруза	Кукурузный точильщик, кукурузная совка, личинка рассады	12.5	7 - 10
Рис	Рисовая кольцевая личинка, зеленые цикадки, огневка, рисовый клоп, рисовый черный клоп, эхтнокок	10 - 12.5	7 - 14 дней в зависимости от уровня заражения вредителями
Табак	Листовертки, совки, гусеница озимой совки	10 - 12.5	7 - 10
Какао	Стрючковый точильщик, Тля	12.5	2 - 4

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА: DELTARIN - 0.05% (DUSTING POWDER).**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.