

# ESTERDEFOR-62%

## ИСТЕРДЕФОР-62%

### ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

**Селективный системный послевсходовый гербицид, используемый для контроля однолетних и многолетних широколистных сорняков на полях пшеницы и ячменя.**

**СОСТАВ:** Каждый килограмм содержит:

**2,4- D ИЗООКТИЛОВЫЙ ЭФИР**

**62% вес / объем  
(активного вещества)**

#### **СВОЙСТВА:**

**ИСТЕРДЕФОР-62%:** селективный системный послевсходовый гербицид, который используется для контроля однолетних и многолетних широколистных сорняков на полях пшеницы и ячменя.

**ИСТЕРДЕФОР-62%:** Пары сложного эфира с низкой летучестью могут привести к химическому ожогу восприимчивых культур (картофель, хлопок и помидор).

**ИСТЕРДЕФОР-62%:** Быстро разрушается на поверхности почвы, поэтому риск накопления гербицида отсутствует.

**ИСТЕРДЕФОР-62%:** не является фитотоксичным для злаков, если при использовании соблюдать рекомендации.

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:**

Используют для борьбы с широколиственными сорняками на полях пшеницы и ячменя.

КУЛЬТУРА	СОРНЯКИ	НОРМА РАСХОДА	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Пшеница	Однолетние и многолетние широколиственные сорняки, такие как вьюнок, ежевика, обычная песчанка, лауэна, колючий дурнишник, блошница (мелколепестник), малая крапива, ореховая трава, белая марь, обычный чертополох и т.д.	40 – 177 мл / Донум	2 недели
Ячмень		40 – 137 мл / Донум	

\* Рекомендуется использовать 10 - 60 литров воды / Донум.

Донум = 1000 м<sup>2</sup>

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

**ВНИМАНИЕ:**

- Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая.
- Фитотоксичен для сельхозкультур, особенно для фруктовых деревьев, виноградной лозы, овощей и декоративных растений.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Перед нанесением распылителя важно провести калибровку.
- Использовать более низкие показатели для ежегодных сорняков.
- Использовать более высокие показатели для многолетних сорняков.
- Нанести на пшеницу весной во время стадии кущения и до того момента, когда колосья начинают коситься; урожайность может быть значительно уменьшена, если распыление проводить слишком рано, а также когда голова находится в начальной стадии.
- Температура во время нанесения должна составлять от 7 до 32 °С.
- Не допускать попадания аэрозоли гербицида или его паров вблизи чувствительных сельхозкультур.
- После применения распылитель следует тщательно очистить раствором воды с моющим средством.
- Более высокая концентрация препарата может привести к химическим ожогам урожая.

**ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫПАС:**

Не пасти или не кормить животных на обработанном поле в течение 7 дней.

**ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** через 12 часов после последнего применения.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.